



ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2054/2016 ΚΕΜΠ.Α.Ο.

DENTAL TRIBUNE

The World's Dental Newspaper | Greek Edition

ORTHO TRIBUNE

ΕΛΛΑΔΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

www.dental-tribune.gr




ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 48

ORTHO TRIBUNE

The World's Orthodontic Newspaper | Greek Edition | Τόμος 2_Τεύχος 1

❖ σελίδα 17 - 24

Η παρακολούθηση των ασθενών αποτελεί υποχρέωση του οδοντιάτρου



Μία συνέντευξη με τον καθηγητή N. Johnson, Αυστραλία

Ο καρκίνος του στόματος θέτει μία σταθερή πρόκληση για τους οδοντιάτρους παγκοσμίως. Στο παγκόσμιο ετήσιο συνέδριο της FDI στο Χονγκ Κονγκ, ο Συντάκτης του DTI D.Zimmermann είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον καθηγητή N.Johnson του Πανεπιστημίου του Southport, στην Αυστραλία, σχετικά με τη νόσο και τις νέες μεθόδους αναγνώρισης και θεραπείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο καρκίνος του στόματος φαίνεται πως αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, παρά τις καμπάνιες ενημέρωσης από οδοντιατρικούς

οργανισμούς όπως η FDI. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τη μάχη έναντι της νόσου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν ορισμένα καλά νέα. Σε χώρες που είχαν τη φήμη πολύ υψηλών ποσοστών καρκίνου του στόματος, όπως μέρη της Γαλλίας, η Ινδία και η Σρι Λάνκα, το ποσοστό καρκίνου του στόματος από αλκοόλ και καπνό μειώνονται. Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος της Δ.Ευρώπης και την Αυστραλία. Εκεί τα ποσοστά μειώνονται από χαμηλότερη βάση.

→ DT σελίδα 7

Τάσεις & Εφαρμογές



Πως μπορούμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες μας στις άμεσες αποκαταστάσεις

Σήμερα μπορούμε να δημιουργήσουμε άμεσες αποκαταστάσεις για περισσότερες περιπτώσεις σε σχέση με το παρελθόν, επεκτείνοντας σταθερά τα όρια των δυνατοτήτων μας

❖ σελίδα 1

Πρακτικά Θέματα



Η παρακολούθηση των ασθενών αποτελεί υποχρέωση του οδοντιάτρου

Οι οδοντίατροι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση πρώιμων σημείων καρκίνου του στόματος. Είναι το οδοντιατρικό επάγγελμα επαρκώς προετοιμασμένο για αυτό το ρόλο;

❖ σελίδα 1

Κλινικά Θέματα



Το πρόβλημα των λευκών κηλίδων

Σε αυτό το άρθρο θα περιγραφεί μία νέα επαναστατική μέθοδος για την αισθητική θεραπεία των λευκών κηλίδων

❖ σελίδα 8

Πως μπορούμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες μας στις άμεσες αποκαταστάσεις

Ένα κλινικό περιστατικό που συνδυάζει ένα υλικό υψηλής απόδοσης και ένα σαφές πρωτόκολλο εφαρμογής



Dr Gauthier Weisrock
Γαλλία

Οι σύγχρονες σύνθετες ρητίνες και τα τυποποιημένα πρωτόκολλα θεραπειών έχουν οδηγήσει σε περισσότερες άμεσες αποκαταστάσεις στην πρόσθια περιοχή σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμη και δύσκολες περιπτώσεις μπορούν να θεραπευθούν στο οδοντιατρείο με προβλέψιμα αποτελέσματα και ελάχιστη απώλεια οδοντικών ιστών.

Μία 24χρονη γυναίκα προσήλθε στο ιατρείο με ένα αισθητικό ζήτημα. Δεν ήταν ικανοποιημένη με την εμφάνισή του 11, που εμφάνιζε έντονη δυσχρωμία μετά από ενδοδοντική

θεραπεία. Η κλινική εξέταση έδειξε πως η ρίζα είχε υποστεί κάταγμα μετά από ατύχημα και ένα σπασμένο κομμάτι είχε επανασυγκολληθεί με ρητινώδες υλικό (εικ. 1 και 2). Κατά την ακτινογραφική εξέταση, βρέθηκε πως η ενδοδοντική θεραπεία είχε πραγματοποιηθεί σωστά. Ωστόσο, δεν είχε χρησιμοποιηθεί ενδορριζικός άξονας.

Λόγω του γεγονότος πως σχεδόν το 50% των οδοντικών ιστών είχαν απωλεσθεί, επιλέξαμε μία άμεση αποκατάσταση, αρκεί να πραγματοποιούνταν με επιτυχία η διαδι-

→ DT σελίδα 2

3 - 4 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα

7^ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Ομιλητές:

- Dr. Stefan Brower (Belgium)
- Dr. Didier Dietschi (Switzerland)
- Prof. Daniel Edelhoff (Germany)
- Dr. Javier Tapia Guandrix (Spain)
- Prof. Syngcuk Kim (USA, University of Pennsylvania)
- Dr. Ziv Mazor (Israel)
- Prof. Angelo Putignano (Italy)
- Dr. Chikunov Sergey (Russia)
- Prof. Martin Trope (USA, University of Pennsylvania)
- Dr. Dietmar Weng (Germany)
- Dr. Spyros Floratos (Greece)
- Dr. George Goumenos (Greece)
- Dr. Stavros Pelekanos (Greece), κ.α.

Διοργάνωση: OMNICONGRESSES Media Partner: dti

Πληροφορίες - εγγραφές: Τηλ.: 210 22.22.637, 6972 036900
e-mail: info@omnicongresses.gr website: www.omnicongresses.gr



← **DT** σελίδα 1

κασία της λεύκανσης του δοντιού. Στο φάσμα των πιθανών θεραπειών, αυτή η προσέγγιση κινείται με-ταξύ της κλασικής αποκα-τάστασης ρητίνης και της ολοκεραμικής όψης και επομένως, θεωρείται κλι-νικά αποδεκτή. Η ασθε-νής, της οποίας ο κύριος προβληματισμός ήταν μία φυσική απόχρωση του δο-ντιού και ελάχιστη απώ-λεια οδοντικών ιστών, συμφώνησε στην προτει-νόμενη θεραπεία.

Χρησιμοποιήθηκε η νανο-υβριδική ρητίνη IPS

Empress Direct για την αποκατάσταση. Εκτός από τα χρώματα αδα-ντίνης και οδοντίνης, το συγκεκριμένο υλικό δια-τίθεται και σε οπαλίζουσα απόχρωση.

Προκαταρκτική θεραπεία

Αρχικά, πραγματοποιή-θηκε εσωτερική λεύκανση στο δόντι, από την οποία θα εξαρτώνταν η επιτυχία της θεραπείας. Η πρόσβα-ση στον πολφικό θάλαμο δημιουργήθηκε μέσω της παλιάς αποκατάστασης. Αφαιρέθηκε στρώμα γου-

ταπέρκας έως 3 χιλ. κάτω από την αδαμαντινο-οδοντινική ένωση. Στο βάθος της κοιλότητας, τοποθετήθηκε υαλοϊονο-μερής κονία σε πάχος 2 χιλ. για να μην εισέλθει ο λευκαντικός παράγοντας σε ευαίσθητες περιοχές. Χρησιμοποιήσαμε μίγμα υπερβορικού νατρίου και απιονισμένου νερού για τη διαδικασία της λεύκανσης. Η κοιλότητα εμφράχθηκε στη συνέχεια με προσω-ρινό υλικό. Εφόσον δεν επετεύχθη το επιθυμητό χρώμα από την αρχική λεύκανση, η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά από



Εικ. 1 Έντονη δυσχρωμία στον 11.

μία εβδομάδα. Μετά από μία εβδομάδα το αποτέλε-σμα ήταν άριστο(εικ. 3).

Για αδρανοποίηση του λευκαντικού παράγοντα, τοποθετήθηκε υδροξεί-διο του ασβεστίου στην κοιλότητα και παρέμει-νε στην περιοχή για μία εβδομάδα. (Συγκολλητι-κός παράγοντας μπορεί



Εικ. 2 Η μορφολογία του 11 ήταν αρμονική σε σχέση με τον 21. Η απώλεια των οδοντικών ιστών ήταν λιγότερο από το 50% του δοντιού.



Εικ. 3 Μετά τη λεύκανση, το χρώμα του 11 ήταν βέλτιστο.

να τοποθετηθεί 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της λεύκανσης, για βέλτιστη συγκόλληση και σταθερό-τητα χρώματος)

Αισθητική διάγνωση και προσδιορισμός χρώματος

Μετά την ανάλυση της οδοντικής μορφολογίας, καταλήξαμε πως οι ανα-λογίες ήταν αρμονικές σε σχέση με τον 21. Για να αποφύγουμε μία λανθα-σμένη ερμηνεία του χρώ-ματος λόγω των ξηρών παρακείμενων δοντιών, το χρώμα προσδιορίστηκε πριν την έναρξη οποιασ-δήποτε παρέμβασης και σε φως ημέρας. Χρησιμο-ποιήθηκε χρωματικός οδη-γός IPS Empress Direct για τον προσδιορισμό των αποχρώσεων της αδα-ντίνης και της οδοντίνης. Το χρώμα της οδοντίνης επελέγη με βάση το αυ-χενικό τριτημόριο και το χρώμα της αδαμαντίνης με βάση το κοπτικό τριτη-μόριο του παρακείμενου δοντιού. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανατομική μορφολογία του παρακεί-μενου δοντιού και διάφο-ρες οπαλίζουσες αντανα-κλάσεις που ήταν ορατές στην κοπτική επιφάνεια, αφού στόχος μας ήταν να μιμηθούμε τα συγκεκριμέ-να χαρακτηριστικά. Προε-τοιμάστηκε ένα διάγραμμα με τα χρώματα των ρητι-νών. Σε αυτήν την περί-πτωση χρησιμοποιήθηκαν μόνο 4 χρώματα: A3/A2 οδοντίνης, A2 αδαμαντί-νης και Trans Opal. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένα υπερώιο κλειδί σι-λικόνης στον 11 με την κατάλληλη μορφολογία και σύγκλειση. Μόλις το-ποθετήθηκε ενδοστοματι-κά, το κλειδί βοήθησε στη δημιουργία του υπερώιου τοιχώματος της αποκατά-στασης σε ένα στάδιο. Το κλειδί περιελάμβανε τα παρακείμενα δόντια στον 11 και κάλυπτε την κοπιτι-



Εικ. 4 Ο 11 με προστομαϊκή λοξοτόμηση και ενθύ βάθος 90 μοιρών.

κή περιοχή.

Παρασκευή δοντιού και τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα

Η υπάρχουσα αποκα-τάσταση αφαιρέθηκε με εργαλεία περιστροφικού τύπου και υπερήχων με προσοχή να μην προκλη-θεί βλάβη στα παρακεί-μενα δόντια. Κατά την Παρασκευή του δοντιού, θα πρέπει να λαμβάνο-νται υπόψη οι μηχανικές ιδιότητες του χρησιμο-ποιούμενου υλικού και η αισθητική ενσωμάτωση. Στην περίπτωση του IPS Empress Direct, το ιδανι-κό σχήμα Παρασκευή πε-ριελάμβανε προστομαϊκή λοξοτόμηση και ένα ευθύ, υπό ορθή γωνία όμορο και υπερώιο όριο(εικ. 4).

Πριν προχωρήσουμε με τη συγκολλητική δια-δικασία, χρειάστηκε να προστατευθεί το επεμβα-τικό πεδίο από το σάλιο ή το αίμα στη στοματική κοιλότητα. Επομένως, απομονώσαμε τα πρόσθια δόντια, συμπεριλαμβανο-μένων των κυνοδόντων, με ελαστικό απομονωτήρα. Το εκτεταμένο επεμβα-τικό πεδίο μας επέτρεψε την εκτίμηση των κοπιτι-κών άκρων, καθώς και του σχήματος και του μεγέ-θους των παρακείμενων δοντιών.Ελέγξαμε αν το κλειδί σιλικόνης θα μπο-ρούσε να τοποθετηθεί με ακρίβεια. (Αν χρειαστεί, σημεία παρεμβολής μπο-ρούν να ρυθμιστούν με ένα νυστέρι μέχρι να επιτευ-χθεί ακρίβης εφαρμογή). Η αδαμαντίνη αδροποιή-θηκε για 30” και η οδοντί-νη για 15”. Στη συνέχεια ακολούθησε έκπλυση και στέγνωμα και των δύο περιοχών. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε συγκολλη-τικός παράγοντας, ενώ τα παρακείμενα δόντια προ-στατεύθηκαν με μεταλλικό

International Imprint	
Licensing by Dental Tribune International	Publisher Torsten Oemus
Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com +49 341 48 474 107 Clinical Editor Magda Wojtkiewicz	Online Editors Yvonne Bachmann Claudia Duschek Copy editors Sabrina Raaff Hans Motschmann
International Editorial Board Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics Dr Karl Behr, Germany – Endodontics Dr George Freedman, Canada – Aesthetics Dr Howard Glazer, USA – Cariology Prof Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry Dr Edward Lynch, Ireland – Restorative Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology Prof Dr Georg Meyer, Germany – Restorative Prof Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology	Publisher/President/CEO Torsten Oemus CFO/COO Dan Wunderlich Media Sales Managers Matthias Diessner (Key Accounts), Melissa Brown (International), Peter Witteczek (Asia Pacific) Maria Kaiser (USA), Weridiana Mageswki (Latin America) Hélène Carpentier (Europe) Director of Finance& Controlling Dan Wunderlich Marketing & Sales Services Esther Wodarski, Nicole Andrä Accounting Karen Hamatschek Business Development Claudia Salwiczek Executive Producer Gernot Meyer
Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 4 84 74 302 Fax: +49 341 4 84 74 173 Internet: www.dental-tribune.com E-mail: info@dental-tribune.com	
Regional Offices Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 105-111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 Fax +852 3113 6199 The Americas Tribune America, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, NY 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 Fax: +1 212 224 7185	
Ελληνική έκδοση Ιδιοκτήτης Αφοί Ρούσση & ΣΙΑ ΟΕ Ανδριτσαίνης 48, Τ.Κ. 11146 Τηλέφωνο +30 210 2222637 - +30 6972036900 E-mail info@omnipress.gr Internet www.dental-tribune.gr Κωδικός 01-7656 Εμβασμα συνδρομών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 179/44015225 ALPHA BANK 218/00-2002-000-260 Εκδότης - Διευθυντής Αφοί Ρούσση & ΣΙΑ ΟΕ Διεύθυνση - Σύνταξη Διεύθυνση - Σύνταξη Επιμέλεια ύλης Ειδικό Συνεργάτες Διαφημίσεις Art Director Υπεύθυνη, Επιμέλεια τεύχους Εκτύπωση Αναγνωστάκη Κωνσταντίνα Ariagraf & ΣΙΑ ΕΕ, Γραφικές Τέχνες Νέα Ζωή, Θέση Λάκο Κάτσαρη, Ασπρόπυργος 19300, τηλ: 210 5822130	
επισκευθείτε μας : www.dental-tribune.gr	

NEO

Bluephase® Style

Η συσκευή φωτοπολυμερισμού



Η μικρότερη LED
για όλες τις χρήσεις



Ελευθερία στον πολυμερισμό

Για κάθε χέρι — άνετο κράτημα για άνδρες και γυναίκες.

Για κάθε υλικό — καθολική χρήση χάρη στο πολυκυματικό polywave® LED ευρέως φάσματος.

Για κάθε φορά — επιλογή ενσύρματης λειτουργίας χάρη στο Click & Cure.

Δείτε την παρουσίαση του
Bluephase Style:
[www.ivoclarvivadent.com/
bluephasestyle_en](http://www.ivoclarvivadent.com/bluephasestyle_en)



www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Benderstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

Επίσημοι διανομείς:

Ελλάδα:

Dental Vision ΕΠΕ

• Μιχαλακοπούλου 125 / 115 27 Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /

• Τσιμισκή 34 / 546 23 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800 / www.dentalvision.gr

SADENT AEBE

• 1 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου / 190 02 Παιανία / τηλ: 211 10 22 900 /

• Τετραπόλεως 4 / 115 27 Γουδή / τηλ: 210 77 77 608 /

• Ν. Τέλλογλου 7 / 546 36 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 968 799 /

• Θεσσαλία / τηλ: 2410 549 168 / www.sadent.com

Κύπρου:

dentalcon trading ltd.

• Λ. Λάρνακα 57, PO Box 27245 / 1643 Λευκωσία / τηλ: 22 466 000 / www.dentalcon.com.cy

**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation

← DT σελίδα 2

τεχνητό τοίχωμα. Λόγω του μη συγκρατητικού σχήματος παρασκευής και του γεγονότος πως το μεγαλύτερο τμήμα της αποκατάστασης θα συγκρατούνταν στην αδαμαντίνη, επελέγη συγκολλητικό με την τεχνική της ολικής αδροποίησης, που είναι ανώτερο από αυτοαδροποιούμενους συγκολλητικούς παράγοντες. Για να διευκολυνθεί η διείσδυση στα οδοντινοσωληνάρια, το συγκολλητικό επαλείφθηκε ήπια

στα τοιχώματα της κοιλότητας (Μετά το στέγνωμα του συγκολλητικού, η κοιλότητα θα πρέπει να εμφανίζει μία στιλπνή εικόνα. Αν δεν ισχύει αυτό, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί). Στη συνέχεια το συγκολλητικό φωτοπολυμερίστηκε για 10'' με λυχνία πολυμερισμού.

Ανασύσταση του υπερώιου και των όμορων τοιχωμάτων

Ως ένα πρώτο στάδιο, κτίστηκε

το υπερώιο τμήμα της αδαμαντίνης. Ένα λεπτό στρώμα ρητίνης αδαμαντίνης(χρώματος Α2) πάχους μικρότερο από 0.5χιλ. τοποθετήθηκε στο κλειδί σιλικόνης και εξομαλύνθηκε με βουρτσάκι. Στη συνέχεια το κλειδί γεμίστηκε με ρητίνη και τοποθετήθηκε στο στόμα όπου ελέγχθηκε η εφαρμογή του. Αν χρειαστεί, το υλικό μπορεί να τροποποιηθεί πριν πολυμεριστεί για 10''.

Το υπερώιο τοίχωμα που δημιουργήθηκε εμφάνιζε το επιθυμητό χρώμα και δεν ερχόταν

σε επαφή με τα παρακείμενα δόντια(εικ. 5). Η τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος ρητίνης αδαμαντίνης(Α2) στα όμορα τοιχώματα άλλαξε τη σύνθετη μορφολογία της κοιλότητας. Για να δημιουργηθεί το λεπτό στρώμα, σταθεροποιήσαμε ένα διαφανές τοίχωμα με ξύλινη σφήνα, για να δημιουργήσουμε τις γραμμές μετάβασης(την κυρτή περιοχή που διαχωρίζει την όμορη από την προστομακική περιοχή)-και το επανορθωτικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε από τον επιτυχημένο



Εικ. 5 Δημιουργία υπερώιου τοιχώματος με ρητίνη αδαμαντίνης(Α2).



Εικ. 6 Σχεδιασμός της όμορης περιοχής και των γραμμών μετάβασης.



Εικ. 7 Ανασύσταση των υπερώιων και όμορων περιοχών ή μετατροπή μίας σύνθετης οδοντικής παρασκευής σε μία απλούστερη.



Εικ. 8 Τοποθέτηση ρητίνης οδοντίνης Α3.



Εικ. 9 Τοποθέτηση ρητίνης οδοντίνης Α2. Το προηγούμενο στρώμα καλύφθηκε πλήρως με αυτό το υλικό.



Εικ. 10 Τοποθέτηση ενός στρώματος ρητίνης αδαμαντίνης Α2.

σχεδιασμό αυτών των περιοχών επειδή δεν είναι δυνατό να σχεδιαστούν με εργαλεία περιστροφικού τύπου. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε σύνθετη ρητίνη άπω του 11, ενώ σταθεροποιήσαμε το τεχνητό τοίχωμα από την αντίθετη πλευρά και πολυμερίσαμε το υλικό στη συγκεκριμένη θέση(εικ. 6). Επομένως, μπορούσε να προστεθεί επαρκής ποσότητα ρητίνης μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή μορφολογία. Η εγγύς επιφάνεια κτίστηκε με τον ίδιο τρόπο(εικ. 7).

Ανασύσταση του σώματος της οδοντίνης

Χρησιμοποιώντας ρητίνη οδοντίνης, δημιουργήθηκε μία αποκατάσταση που εμφανίζει μει-

ΜΙΚΡΟΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ:

Οπτικό Μικροσκόπιο - Ανατομία συστήματος ριζικών σωλήνων
Χημικομηχανική επεξεργασία - Έμφραξη

BASIC LEVEL

Σ. Φλωράτος, Ενδοδοντολόγος

22 Φεβρουαρίου 2014,
Αθήνα

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πάνω στις νεότερες τεχνικές χημικομηχανικής επεξεργασίας με μηχανοκίνητα εργαλεία και έμφραξης των ριζικών σωλήνων με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου.

Αναλυτικά το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει:

- Χρήση μικροσκοπίου στην ενδοδοντία μέσα από κλινικά περιστατικά
- Βασικές αρχές/Κανόνες διάνοιξης
- Κανόνες ανεύρεσης του 2ου εγγύς παρειακού σωλήνα
- Βιοβιοτικές αρχές χημικομηχανικής επεξεργασίας
- Πρωτόκολλα αποθύμανσης
- Τεχνικές έμφραξης με θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα

Στο πρακτικό μέρος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε:

- Ανεύρεση 2ου εγγύς παρειακού σωλήνα σε άνω γομφίο
- Χημικομηχανική επεξεργασία με μηχανοκίνητα περιστρεφόμενα εργαλεία
- Έμφραξη με θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα



Διοργάνωση: OMNI CONGRESSES

Χορηγός: FKG swiss endo



Για πληροφορίες - εγγραφές: Τηλ.: 210 222 2637, 210 213 2084
e-mail: info@omnicongresses.gr, info@omnipress.gr web: www.omnicongresses.gr, www.omnipress.gr

NEO

SR Nexco®

Η φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη για το εργαστήριο

Φυσική εμφάνιση - εύκολη κατασκευή



SR Nexco® Paste – για ένα εκπληκτικά ευρύ φάσμα εφαρμογών στο εργαστήριο

- **Με μικρο-οπαλίζουσες ενισχυτικές ουσίες** για αποκαταστάσεις με και χωρίς σκελετό.
- **Φυσικές οπτικές ιδιότητες** χάρη στην σταθερότητα της απόχρωσης ακόμη και σε διαφορετικά πάχη.
- **Ευέλικτη επιλογή εξοπλισμού** - πολυμερισμός ως συνήθως.

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Benderstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

Επίσημοι διανομείς:
Ελλάδα:

Dental Vision ΕΠΕ

• Μιχαλακοπούλου 125 / 115 27 Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
• Τιμιμσκή 34 / 546 23 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800 / www.dentalvision.gr

SADENT ΑΕΒΕ

• 1 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου / 190 02 Παιανία / τηλ: 211 10 22 900 /
• Τετραπόλεως 4 / 115 27 Γουδή / τηλ: 210 77 77 608 /
• Ν. Τέλλογλου 7 / 546 36 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 968 799 /
• Θεσσαλία / τηλ: 2410 549 168 / www.sadent.com

Κύπρου:

dentalcon trading ltd.

• Λ. Λάρνακα 57, PO Box 27245 / 1643 Λευκωσία / τηλ: 22 466 000 / www.dentalcon.com.cy


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

← DT σελίδα 4

ωμένο χρωματικό κορεσμό από την αυχενική προς την κοπτική και από την υπερώια προς την προστοματική περιοχή. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόζεται μία τεχνική διαστρωμάτωσης στις 3 διαστάσεις, χρησιμοποιώντας υλικά με διαφορετικά επίπεδα χρωματικού κορεσμού. Στην περίπτωση μας, χρησιμοποιήθηκε ένα υλικό με κορεσμό ένα βαθμό υψηλότερο από το τελικό επιθυμητό χρώμα. Επο-

μένως, χρησιμοποιήθηκε ρητίνη οδοντίνης χρώματος A3 στην περιοχή του αυχενικού ορίου.

Το στρώμα τοποθετήθηκε στο υπερώιο τοίχωμα με μία επίπεδη σπάθη κατάλληλη για σύνθετες ρητίνες(εικ. 8). Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε ένα στρώμα ρητίνης οδοντίνης με χαμηλότερο κορεσμό (χρώματος A2). Ένα εργαλείο με κωνικό άκρο σιλικόνης χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό ενός ελαφρώς κυματοειδούς ορίου που καλύπτει τη μισή λοξοτόμηση έως και 1χιλ. κάτω από το κοπτικό άκρο(εικ.

9). (Αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη τεχνική, η ημιδιαφάνεια της ρητίνης αδαμαντίνης γίνεται ορατή στην περιοχή του κοπτικού άκρου και η μετάβαση από τους οδοντικούς ιστούς έως τη σύνθετη ρητίνη καλύπτεται). Κάθε στρώμα ρητίνης πολυμερίστηκε με τη λυχνία πολυμερισμού για 10".

Σχεδιασμός της περιοχής της αδαμαντίνης

Ο οπαλισμός ενισχύθηκε από

την τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος υλικού Trans Oral στην κοπτική περιοχή. Καθώς το οπτικό εφέ του συγκεκριμένου υλικού είναι ιδιαίτερα έντονο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία μικρή ποσότητα. Τοποθετήθηκε ένα στρώμα ρητίνης αδαμαντίνης(A2) σε αρκετά στάδια στην προστοματική περιοχή, διαμορφώθηκε με βουρτσάκια και πολυμερίστηκε για 10". Αυτό το υλικό αδαμαντίνης κάλυψε ολόκληρη την αποκατάσταση(εικ. 10).



Εικ. 11



Εικ. 12


Εικ. 11, 12 Ο 11 με αρμονική εμφάνιση, που επετεύχθη με ελάχιστη απόβλεια οδοντικών ιστών.

Έξυπνες Συσκευές από την StomaScience



Ηλεκτρονική Καταγραφή Σύγκλεισης

Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα μιάς σωστής σύγκλεισης και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν σε μία συγκλεισιακή δυσαρμονία, το T-Scan καταγράφει τις συγκλεισιακές δυνάμεις και την ένταση των επαφών μέσα στο χρόνο, μέσω εκατοντάδων αισθητήρων. Τα στοιχεία καταγράφονται και μεταφέρονται αυτόματα στον Η/Υ, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει ανάλυση της σύγκλεισης και 3D απεικόνιση των συγκλεισιακών δυνάμεων σε ένα γράφημα.



Syncrystallization System

Is an innovative technique which connects directly into the mouth titanium bar to abutments



Είναι μια καινοτόμος τεχνική με την οποία μπορείτε να συνδέσετε απ'ευθείας μέσα στο στόμα μια δοκό τιτανίου με τα προσωρινά ή και τα μόνιμα κολοβώματα. Αυτό επιτρέπει μια παθητική σύνδεση των εμφυτευμάτων, χωρίς παραμορφώσεις και να έχετε άμεσα ένα σκελετό τιτανίου για την προσθετική υπερκατασκευή. Μια σειρά ερευνών δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά (JOMI, JPerio) έδειξαν ότι η τεχνική είναι απόλυτα ασφαλής και το ποσοστό επιτυχίας σε άμεση φόρτιση είναι 100% !

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

www.stomascience.com

☎ 801 11 67700

☎ 6944 960164

Τελείωση και στίλβωση

Τα δόντια της ασθενούς εμφάνιζαν έντονα μορφολογικά χαρακτηριστικά(κατακόρυφες αύλακες και οριζόντιες γραμμώσεις). Η μίμηση αυτών των χαρακτηριστικών για μία φυσική εμφάνιση της αποκατάστασης αποτέλεσε ένα δύσκολο στόχο.Αυτό το στάδιο ήταν εξίσου σημαντικό με τον προσδιορισμό του κατάλληλου χρώματος. Μιμηθήκαμε την επιφανειακή υφή με λεπτόκοκκρες φρέζες διαμαντιού, χρησιμοποιώντας φλογοειδή και αποστρογγυλεμένου σχήματος εργαλεία. Οι φρέζες χρησιμοποιήθηκαν χωρίς καταιονισμό νερού. Ένα ακόμη σημαντικό στάδιο ήταν η τελείωση των γραμμών μετάβασης και των όμορων περιοχών. Προτείνεται η χρήση ταινιών στίλβωσης επειδή τα εργαλεία περιστροφικού τύπου μπορεί να δημιουργήσουν επίπεδες περιοχές που προκαλούν ακατάλληλες αντανάκλασεις. Δίνουμε πάντα προσοχή στην άριστη στίλβωση των αποκαταστάσεων αποφεύγοντας τη βλάβη στην επιφανειακή υφή που έχουμε δημιουργήσει. Η στίλβωση διευκολύνθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής στίλβωσιμότητας της σύνθετης ρητίνης(εικ. 11 και 12).

Συμπεράσματα

Εξαιτίας των επανορθωτικών υλικών υψηλής απόδοσης, τα οποία βελτιώνονται συνεχώς και μίας ξεκάθαρης θεραπευτικής προσέγγισης, μπορούμε να δημιουργήσουμε άμεσες αποκαταστάσεις για περισσότερες περιπτώσεις σε σχέση με το παρελθόν, επεκτείνοντας σταθερά τα όρια των δυνατοτήτων μας. Το πλεονέκτημα των άμεσων αποκαταστάσεων είναι πως εξοικονομείται χρόνος και είναι συντηρητικές. Πάντως, υπάρχει περίπτωση δόντια με άμεσες αποκαταστάσεις να εμφανίσουν ξανά δυσχρωμία παρά το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορεί να αποφευχθεί μία διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό

DTI Asia Pacific Edition, No 6, Vol. 10

← DT σελίδα 1

Σε αυτές τις χώρες ή πληθυσμούς με παραδοσιακά υψηλά ποσοστά, ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη νόσο. Σε τμήματα της Α.Ευρώπης και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, τα ποσοστά του καρκίνου του στόματος αυξάνονται, λόγω της υψηλής κατανάλωσης καπνού, την κατάχρηση αλκοόλ και την κακή διατροφή.

Τα άλλα κακά νέα είναι πως η επίπτωση καρκίνων του στοματοφάρυγγα(σε αντίθεση με τα χείλη και το στόμα) αυξάνεται επίσης παγκοσμίως.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο HPV έχει αναγνωριστεί ως αυξανόμενος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του στόματος. Ποιο ρόλο παίζει η σεξουαλική μετάδοση του ιού στην ανάπτυξη της νόσου σε σχέση με πιο συνήθεις παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ορισμένοι τύποι του HPV σχετίζονται με καρκίνους της ανώτερης αναπνευστικής οδού, ειδικά των αμυγδαλών και της βάσης της γλώσσας, αντί για το ίδιο το στόμα. Πρόκειται για τους ίδιους ιούς που προκαλούν καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας και τα γεννητικά όργανα. Πιστεύεται γενικά πως εμπλέκεται η σεξουαλική μετάδοση. Τα στοιχεία είναι σε σημαντικό βαθμό περιστασιακά. Αυτό σημαίνει, αυτά τα καρκινώματα είναι συνηθέστερα μεταξύ νεαρών ενηλίκων και υπάρχει συσχέτιση με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων.

Ευτυχώς-αν αυτή είναι μία κατάλληλη λέξη-αυτά τα καρκινώματα είναι πιο ευαίσθητα στην ακτινοθεραπεία και τα ποσοστά επιβίωσης/θεραπευτικά αποτελέσματα είναι καλύτερα σε σχέση με τα περισσότερα καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου.

Για την τελευταία δεκαετία, υπάρχουν εκτεταμένα προγράμματα ανοσοποίησης έναντι αυτών των συγκεκριμένων ιών που πραγματοποιούνται σε νεαρές γυναίκες σε πολλές χώρες. Έχουν στόχο την πρόληψη του καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας.

Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε, σε άλλα 20 χρόνια από σήμερα, αν αυτό είχε μία επίδραση στον καρκίνο της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Ευτυχώς, αρχίζουμε να βλέπουμε

αγόρια να περιλαμβάνονται στα προγράμματα ανοσοποίησης σε ορισμένες χώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ορισμένες μορφές καρκίνου του στόματος έχουν ποσοστό επιβίωσης μόνο 50%. Τι καθιστά τόσο δύσκολο ένα πιο επιτυχημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μέση πενταετής επιβίωση καρκίνου του στόματος κυμαίνεται μεταξύ 40

και 50% για δεκαετίες στις περισσότερες χώρες.

Σε εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα με μεγάλο αριθμό ασθενών, οι ασθενείς έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής/ελαχιστοποίηση των αναπηριών και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Οι κύριοι λόγοι που δε βελτιώνονται τα ποσοστά αυτά είναι

επειδή πολλά περιστατικά διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο και /ή οι ασθενείς εμφανίζουν και άλλα επιβαρυντικά νοσήματα όπως καρδιαγγειακές νόσους ή καρκίνο σε άλλα σημεία του σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι οδοντίατροι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση πρώιμων σημείων καρκίνου του στόματος. Είναι το οδοντιατρικό επάγγελμα επαρ-

κώς προετοιμασμένο για αυτό το ρόλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις. Πολλοί οδοντίατροι παρακολουθούν άριστα τους ασθενείς τους. Αυτό είναι πράγματι το καθήκον μας. Μπορεί να ονομαστεί ευκαιριακή εξέταση. Πολλοί διεθνείς οδοντιατρικοί οργανισμοί, όπως η FDI, προάγουν μία τέ-

→ DT σελίδα8



3i T3 IMPLANT™

Το 3i T3™ Implant είναι σχεδιασμένο για αισθητικά αποτελέσματα μέσω της διατήρησης των περιεμφυτευματικών ιστών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
Σύγχρονος Υβριδικός Σχεδιασμός

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Λόγω Πολυεπίπεδης Μορφολογίας της Επιφάνειας

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ
Λόγω Ενσωματωμένου Σχεδιασμού Εναλλαγής Πλατφόρμας

PRESERVATION BY DESIGN™

BIOMET 3i™
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME™

Impladend 3i™
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: Φωκίδος 57-59, 115 27 Γουδί, Τηλ.: 210.74.86.900
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βασ. Όλγας 48, 546 42, Τηλ.: 2310.501.651, Fax: 2310.862.090
ΚΥΠΡΟΣ: Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Καραϊσκάκη 19, Λεμεσός, Τηλ.: 00357.2537.6631
www.impladend.com • E-mail: info@impladend.com

← DT σελίδα 4

τοια συμπεριφορά. Υπάρχουν άριστα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον εντοπισμό ασθενών και βλαβών σε κίνδυνο.

Αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με υποστήριξη από τους οδοντιάτρους για την πρόληψη/διακοπή του καπνίσματος, μετριασμό της κατανάλωσης αλκοόλ, προαγωγή της υγιούς διατροφής και καλή υγιεινή(στοματική και σεξουαλική) για όλους τους ασθενείς.

Από την άλλη πλευρά, η συχνότητα δυνητικά κακοήθων διαταραχών και φυσικά του καρκίνου του στόματος, είναι χαμηλή σε πολλές χώρες κι έτσι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ενημέρωσης και ενδιαφέροντος μεταξύ των γενικών οδοντιάτρων είναι δύσκολη. Ορισμένοι αποθαρρύνονται επειδή η εξέταση του καρκίνου μπορεί να μην αποτελεί μία αναγνωρίσιμη δραστηριότητα.

Στο Ν.Ασία και άλλες μεταναστευτικές χώρες, οι δυνητικά κακοήθεις στοματικές διαταραχές είναι συνήθεις και παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα των οδοντιάτρων και του κοινού σε αυτά τα μέρη του κόσμου.

Πρόσφατα, μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Research πρότεινε μία μέθοδο θεραπείας με την αναστολή μίας πρωτεΐνης που παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση και την υποτροπή του καρκίνου του στόματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η άποψή σας για τη συγκεκριμένη έρευνα και υπάρχουν κι άλλες υποσχόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν πολλές βιοχημικές/μοριακές οδοί που εμπλέκονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την ωρίμανση, τη μετανástευση και τη μετάσταση και τον θάνατο κυττάρων στους ιστούς. Πολλές είναι στόχοι ερευνών και διαχείρισης. Ορισμένες θα αποδειχθούν άσχετες-στην

καλύτερη περίπτωση επιφαινόμενα. Η παρέμβαση σε ορισμένες οδούς θα επηρεάσει επίσης τους φυσιολογικούς ιστούς, ειδικά αν αντιπροσωπεύουν την ενίσχυση οδών που αποτελούν μέρος φυσιολογικών κυτταρικών ελέγχων.

Ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το γεγονός πως γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης οδών που είναι σημαντικές για τα βλαστοκύτταρα-που παρέχουν τη βάση για την ανανέωση των κυτταρικών πληθυσμών. Αυτή τη στιγμή, οι παρατηρήσεις σε αυτήν την οδό σε ανθρώπινα καρκινώματα διερευνώνται σε πειραματόζωα.

Προέρχεται κατά κάποιον τρόπο από μελέτες σε ανθρώπους, παρόλο που υπάρχουν πολλές μελέτες σε ανθρώπους για άλλες βιολογικές θεραπείες για καρκίνο του στόματος και άλλων περιοχών. Βασικά, αποτελεί την έρευνα του μέλλοντος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν διάφορα συστήματα εξέτασης του καρκίνου του στόματος στην αγορά αλλά η διεύθυνσή τους στα οδοντιατρεία είναι χαμηλή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τον καρκίνο και δυνητικά κακοήθεις διαταραχές, στο ίδιο το στόμα, η άμεση επισκόπηση και ψηλάφηση, ακολουθούμενη από παραπομπή ή βιοψία, αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση. Συμπληρωματικές εξεταστικές δοκιμασίες δεν έχουν αποδειχθεί χρήσιμες πέρα από αυτό και η εμπορευματοποίησή τους μπορεί να είναι αντιπαραγωγική.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε ήδη αναφέρει τη Γενετική. Ποιο ρόλο θα παίξει στην αξιολόγηση του καρκίνου του στόματος στο μέλλον;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο καρκίνος αποτελεί φυσικά ένα γενετικό νόσημα. Υπάρχει ένα μικρό μέρος γενετικά κληρονομούμενης ευπάθειας, όχι όμως τόσο σημαντικής όπως στον καρκίνο του μαστού, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος επίκτητης

γενετικής ανωμαλίας, που αποκαλύπτεται σταδιακά. Έτσι, η γενετική εξέταση έχει μεγάλη σημασία, πιθανόν για την ευπάθεια, περισσότερο για πρώιμες αλλαγές στους ιστούς κατά την καρκινογένεση, τα οποία μπορεί να ανιχνευθούν και με τη βοήθεια σάλιου ή αίματος.

Ωστόσο, κάθε καρκίνος αποτελεί ένα μοναδικό βιολογικό γεγονός σε κάθε άτομο. Η ανίχνευση του εύρους των γενετικών ανωμαλιών στον κάθε ασθενή και η στόχευση αυτών με συγκεκριμένα φάρμακα ή με γονιδιακή θεραπεία ή ανοσοθεραπεία είναι μία συναρπαστική προοπτική, καθώς βρισκόμαστε στην εποχή της εξατομικευμένης Ιατρικής.

Η εκτεταμένη χειρουργική θεραπεία, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία δεν έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Το μέλλον έγκειται στην εξατομικευμένη βιοθεραπεία. Για τον κόσμο, το μέλλον θα πρέπει να είναι η πρωτογενής πρόληψη.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

Το πρόβλημα των λευκών κηλίδων

Μια νέα μέθοδος επαναμεταλλικοποίησης μετά την ορθοδοντική θεραπεία

Οι απομεταλλικοποιημένες λευκές κηλίδες εμφανίζονται συχνά μετά την ορθοδοντική θεραπεία. Ορισμένα δόντια είναι περισσότερο ευπαθή στην απομεταλλικοποίηση, τυπικά οι άνω πλάγιοι τομείς και οι κάτω κυνόδοντες. Η άπω ουλική περιοχή της χειλικής επιφάνειας της αδαμαντίνης προσβάλλεται συχνότερα(εικ. 1). Τις πρώτες λίγες εβδομάδες μετά την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανημάτων, παρατηρείται μείωση στο μέγεθος των λευκών κηλίδων καθώς και την εμφάνισή τους, πιθανόν λόγω της δράσης του σάλιου(εικ. 2).

Έχουν προταθεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για να βοηθήσουν στη διαδικασία της επαναμεταλλικοποίησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το φθόριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε υψηλή συγκέντρωση, καθώς τείνει να εμποδίζει την απομεταλλικοποίηση και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη εμφάνιση δυσχρωμίας. Χαμηλές συγκεντρώσεις φθορίου, ωστόσο, μπορεί να βοηθήσουν στην επαναμεταλλικοποίηση, όπως αυτές που συναντώνται σε υλικά καζεΐνης φωσφορικού ασβεστίου.

Επίσης, η διέγερση της σιαλικής ροής από τημάσηση τοίκλας χωρίς ζάχαρη είναι επωφελής. Σε αυτό το άρθρο θα περιγραφεί μία νέα επαναστατική μέθοδος για την αισθητική θεραπεία των λευκών κηλίδων(εικ. 3).

Με το Icon, μία μικροεπεμβατική τεχνολογία από την εταιρεία DMG, η απομεταλλικοποιημένη αδαμαντίνη μπορεί να ενισχυθεί χωρίς χρήση τροχού ή αναισθησίας(εικ. 4 και 5).

Ένας από τους λόγους που οι προηγούμενες προσεγγίσεις για την θεραπεία των λευκών κηλίδων έχουν αποτύχει είναι πως η θεραπεία με φθόριο δεν είναι πάντα αποτελεσματική σε προχωρημένα στάδια, και η χρήση επανορθωτικών εμφράξεων συνήθως οδηγεί στην αφαίρεση σημα-



Εικ. 1 Τυπικές λευκές κηλίδες σχήματος C ή ανώμαλου.



Εικ. 2 Τερηδονική βλάβη με λεία επιφάνεια.




Εικ. 3 Κλινική εικόνα μίας αρχόμενης τερηδονικής βλάβης.


ντικής ποσότητας υγίων οδοντικών ιστών.

Αντί να υιοθετήσει μία θεραπεία αναμονής αποτελεσμάτων, το Icon φαίνεται πως αναστέλλει την εξέλιξη των πρώιμων βλαβών της αδαμαντίνης έως και το πρώτο τρίτη μόριο της οδοντίνης με μία απλή διαδικασία(εικ. 6), χωρίς περιττή απώλεια υγίων οδοντικών ιστών. Στη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, η επιφάνεια της λευκής κηλίδας αποτρίβεται με gel HCI 15%, που ανοίγει το πορώδες σύστημα της βλάβης. Στη συνέχεια στεγνώνεται με αιθανόλη, ακολουθούμενη από την τοποθέτηση Icon στη βλάβη με ειδικό εργαλείο. Ο εξαιρετικά υψηλός συντελεστής διείσδυσης δίνει τη δυνατότητα διόδου στους πόρους της βλάβης. Στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια του υλικού και το υλικό φωτοπολυμερίζεται. Ο συνολικός χρόνος θεραπείας θα πρέπει να είναι περίπου 15 λεπτά(εικ. 7).

Η αισθητική θεραπεία των τερηδογονόγων λευκών κηλίδων σε μία συνεδρία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ειδικά σε νέους ασθενείς και τους γονείς τους(εικ. 8a, b). Δεν απαιτείται χρήση τροχού ή



Εικ. 4 Κλινική εικόνα αρχόμενης τερηδονικής βλάβης.



Εικ. 5 Πορώδες σύστημα μίας αρχόμενης τερηδονικής βλάβης.



Εικ. 6 Η πρώτη θεραπεία για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πρόληψης και αποκατάστασης.



Εικ. 7 Διαδικασία σε λείες επιφάνειες.



Εικ. 8a



Εικ. 8b

Εικ. 8 a, b Οι βλάβες πριν και μετά την θεραπεία με Icon.

αναισθησίας και οι ασθενείς που δεν εφαρμόζουν καλή στοματική υγιεινή μπορούν να θεραπευθούν σε πιο πρώιμο στάδιο.

Προτείνω οι οδοντίατροι να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο σύστημα κατά την προσπάθεια επαναμεταλλικοποίησης των λευκών κηλίδων μετά την ορθοδοντική θεραπεία. Αποτελεί μία ελάχιστη επεμβατική θεραπεία για τα δόντια των ασθενών μας.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό DTI Middle East&Africa Edition, Μάιος-Ιούνιος 2012

Γέλη απώθησης ούλων

Racegel - Ενισχύει την επιτυχία και την προβλεψιμότητα στην κατασκευή των ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων



Leonard A. Hess, DDS

Ιδιωτικό ιατρείο, Μονρόε, Βόρεια Καρολίνα, Αμερική

Εισαγωγή

Στην ακίνητη προσθετική τα κλινικά αποδεκτά αποτυπώματα αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή κατασκευή (Εικ.1).

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο περιορίζεται για την άριστη τελική κατασκευή της αποκατάστασης από την ποιότητα του εισερχόμενου αποτυπώματος. Η δυστυχής αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα αποτυπώματα είναι κλινικώς απαράδεκτα 1. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που βλέπουμε είναι αποσχίσεις, φυσαλίδες, εγκλωβισμός υπολειμμάτων, αστοχία του αποτυπωτικού δισκαρίου, διαχωρισμός αποτυπωτικού υλικού/δισκαρίου και έλλειψη καταλύτη στο υλικό 2. Δυστυχώς πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι εμφανή στο όριο της αποκατάστασης. Κάθε έλλειψη λεπτομερειακής απόδοσης του ορίου της αποκατάστασης αφήνει τον οδοντοτεχνίτη να μαντέψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η περιοχή αυτή είναι επιρρεπείς στη συγκέντρωση αίματος, υπολειμμάτων και άλλων λεμφατικών εκκρίσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη υδρόφιλη φύση των περισσότερων αποτυπωτικών υλικών, διάφορα προβλήματα γρήγορα θα παρατηρηθούν.

Ο πιο προβλέψιμος τρόπος για να αποκτήσεις ένα ποιοτικό αποτύπωμα είναι να ξεκινήσεις με υγιή ιστό. Το αρχικό σχέδιο θεραπείας θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε απαραίτητη περιοδοντική θεραπεία, οδηγίες στοματικής υγιεινής στον ασθενή και έλεγχο τερηδονισμού οδόντων³. Διαφορετικές απόψεις υπάρχουν για να βοηθήσουμε στον έλεγχο των ιστών. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση νημάτων απώθησης των ούλων, χημικών αιμοστατικών παραγόντων, λάιζερ μαλακών ιστών και γέλη ή πάστες ιστών μεμονωμένα ή με ποικίλους συνδυασμούς. Προσοχή θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται για τη θέση της φατνιακής απόφυσης και το τύπο του ουλικού ιστού. Σε μια φυσιολογική αναλογία απόφυσης, το βάθος από το ουλικό όριο ως το οστό είναι 3 με 4 χιλιοστά. Μεγαλύτερη απόσταση δηλώνει χαμηλή σχέση φατνιακής απόφυσης. Βάθη λιγότερα των 3 χιλιοστών δηλώνουν υψηλή σχέση φατνιακής απόφυσης.⁴ Ιστός με χαμηλή θέση φατνιακής ακρολοφίας

είναι λιγότερο υποστηρικτικός, περισσότερο χαλαρός και επιρρεπής σε υφισχίσεις ως αποτέ-

λεσμα τραύματος ή υπερβολικής επεξεργασίας. Ο ιστός που σχετίζεται με υψηλή φατνιακή

απόφυση είναι συνήθως παχύς, ινώδης και αντέχει περισσότερο την καταστροφή. Όμως, η υψη-

λότερη φατνιακή απόφυση είναι

→ DT σελίδα 10

Racegel

Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα αυχενικά όρια των κομβωμάτων για την κατασκευή των προσθετικών αποκαταστάσεων.



- Το Racegel τοποθετείται εύκολα, με μεγάλη ακρίβεια και είναι ατραυματικό στον ουλικό ιστό.
- Το Racegel ελέγχει την ουλική αιμορραγία και οποιαδήποτε εξίδρωμα της ουλοδοντικής σχισμής, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη λήψη των τελικών αποτυπωμάτων.
- Το Racegel διατίθεται σε λεπτή σύριγγα με κεκαμμένα ρύγχη και είναι εξαιρετικά εργονομικό και οικονομικό προϊόν.

Συσκευασία

Διατίθεται σε 3 λεπτές σύριγγες των 1.4 gr με 20 κεκαμμένα ρύγχη.



Οδοντιατρικά - Ορθοδοντικά

Μιχαηλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,
Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100,
www.tsaprazis.gr, e-mail: info@tsaprazis.gr

