

The World's Dental Newspaper

XVIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM



hirdetés



MULTINEO™

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS



Kónuszos
felépítmény
kapcsolat

Erősebb és
egyenletesebb
csatlakozás

Kisebb
mikromozgás

Platform
switching



Conical Narrow
Connection (CHC)



Conical Standard
Connection (CS)



Internal Hex
Connection (IH)



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

-1. oldalról

szabb időre, akkor a megszokott orvosát kereső betege sem fogja őt megtalálni.” Mások azt is kétségbe vonják, hogy szerencsés ötlet a megyék ellátásának átszervezését az amúgy is sok gonddal küzdő megyei kórházak vezetőire bízni, hiszen ők szükségszerűen a saját intézményük működtetéséért küzdenek. Így pedig ez azzal járhat, hogy az alap- és szakellátás szerepe csökken, a gyógyítás távolabb kerül a betegektől, az ellátás pedig összességében drágább lesz.

Az *Index*nek nyilatkozó *Sinkó Eszter* egészségügyi közgazdász is az ellátórendszer kórházcentrikusságának további erősödésében látta az egyik legnagyobb fenyegetést. Emlékeztett: már ma is több megyei kórházban szünetelnek egyes ellátások, s reális veszély, hogy a szakemberhiányukat az irányításuk alá rendelt városi kórházak és szakrendelők dolgozóival próbálják majd pótolni. Így egyre több olyan vizsgálat és kezelés lehet, ami csak a megyei intézményekben érhető el, ahol viszont ezek erősen túlterheltek lesznek. Erre is alapozza Sinkó Eszter azt a jóslatát,

hogy a betegek hozzáférése nem csupán az alapellátáshoz, hanem a szakellátáshoz is romlani fog. S e veszély miatt különösen is hiányolja, hogy az intézkedéscsomag nem is foglalkozik azzal, hogy a betegeknek ellátási garanciákat határozzon meg. Például a tekintetben, hogy egy-egy meghatározott probléma kivizsgálását és ellátását mennyi időn belül garantálja a közellátás?

Ez az intézkedéscsomag egy kulcs-hiányosságának látszik. Ennek pótlása ugyanis rögtön rávilágítana arra a tarthatatlan helyzetre, hogy a közellátásban mind nagyobb számban vannak olyan fehér foltok, ahol „nincs senki, aki a tb-biztosított beteget fogadná”. Ha pedig többé nem lehetne elfedni e problémát a betegek korlátlan sorbaállításával, akkor az megkerülhetetlenné tenné a közellátás és a magánegészségügy viszonyának régóta halogatott rendezését is. Ez utóbbit a Takács-csomag meg sem kísérelte.

„Mindig leírtuk, hogy a köz és a magán viszonyának rendezése nélkül nem lehet tisztességes egészségügyet csinálni” – emlékeztetett e hiányosság súlyára a már idézett interjúban Kincses Gyula kamarai

elnök. Ő ott ehhez hasonlóan hiányolta azt is, hogy a finanszírozási kérdések sem kerültek napirendre a parlament elé terjesztett törvényjavaslattal együtt.

Miközben sokan várták, hogy a Takács-csomag milyen új megoldásokat próbál ki a régi ágazati problémák megoldására, kibontakozott néhány újabb válság is. A pandémiára jött a szomszédos Ukrajna lerohanása, meg a gazdasági krízis és az energiaválság. „Lassan világossá válik: a ‚boldog békeidőknek’ egy ideig biztosan vége” – állapította meg a fogászat helyzetét bemutató cikkében *Dul Zoltán* novemberben a *Magyar Orvosban*. Emlékeztetett, hogy egy év alatt másfél-kétszeresükre is nőttek a fogorvosi anyagok beszerzési költségei, melyeket az általános inflációs lendületen túl az euró-forint árfolyam romlása is emel. Ehhez jön még a rezsiköltségek egyelőre ki sem számítható megugrása. A szombathelyi fogorvos szerint még megjósolni is nehéz, hogy ki lesz nehezebb helyzetben a szakmában: a jelentősen szűkülő kereslet ellenére áremelésre kényszerülő magánfogászatok vagy a költségeiket csak részben fedező állami finanszírozásból működő közszolgáltatók?

Az utóbbiak esetében az új bajok – mint *Dul Zoltán* is emlékeztet – néhány régebb óta megoldatlanhoz társulnak. Ilyen például az iskolafogorvosok helyzete, vagy az alapellátó praxisok rendszeres rezsitámogatásában még mindig fennálló 110 000 Ft-os lemaradás a fogászatok kárára. A MOK Háziorvosi Csoportja október-november fordulóján pontosabban is igyekezett felmérni, hogy mekkora bajt okozhat a rezsigrás a háziorvosoknál, illetve az alapellátó fogorvosoknál. A kérdőívükre érkezett több mint 1600 válaszból az tűnt ki, hogy e tekintetben a fogorvosok praxisai a kiszolgáltatottabbak. Ugyanis azok 80 százaléka magántulajdonú rendelőben működik (háziorvosiaknál: 65%) és 56 százalékuk semmilyen rezsitámogatást nem kap az önkormányzattól (a háziorvosoknál: 41%). Az energiaköltségek mostani megugrása viszont erősen fenyegeti őket: a rendelők több mint kétharmada gázt használ, s több mint felükben nincs is alternatív fűtési mód!

A praxisok gazdái a felmérés idején még nem láthatták az új tarifás téli számlákat, így a várakozásaikról nyilatkoztak. A fogorvosok mintegy

ötöde gondolta, hogy legfeljebb duplázódik a számlája, de nagyjából ugyanennyien számítottak arra, hogy legalább a nyolcszorosára ugrik a rezsijük.

A MOK ezek alapján a finanszírozási problémákat enyhítő javaslatokat is megfogalmazott az egészségügyért felelős államtitkárság számára. Így egyebek mellett kérték az iparűzési adómentesség teljes kiterjesztését. (Jelenleg a fogorvos-praxisok kevesebb mint ötöde kap illet az önkormányzattól.) Kérték továbbá a rezsitámogatás növelését egységesen 640 ezer forintra. Valamint arra is kérték lehetőséget, hogy a praxisok az önkormányzatok döntésétől függetlenül is önállóan szerződhesenek kedvezőbb tarifákkal az energiaszolgáltatókkal.

A kezdeményezés eredményéről *Dul Zoltán* is beszámolt az említett cikkében: „a jelzés a kormányzat részéről egyértelmű: jelen gazdasági helyzetben emelésre és kompenzációra nem számíthatunk”. S a jóslata sem sokkal biztatóbb: „Fel kell készülnünk, hogy egy jelentős ideig együtt kell élnünk az emelkedő inflációval, a lassuló gazdasággal és a csökkenő piaci kereslettel.” **DT**

„Mintha a baktériumok stoppolnának a gombákon” – hogyan „sétálnak” az organizmusok a fogakon keresztül?

Anisha Hall Hoppe,
Dental Tribune International

A Pennsylvanai Egyetem kutatócsoportja megállapította, hogy a baktériumok csoportjai a növekedést követő órákon belül képesek voltak saját testhosszuk több mint 200-szorosát „átugrani” a fogfelszíneken, és ezzel megragadó magyarázatot adtak a gyors bakteriális kolonizáció és a fogszuvasodás hátterében álló mechanizmusra.

Az egyetem sajtóközleményében a társszerző, Prof. Hyun (Michel) Koo, az egyetem Innovációs és Precíziós Fogászati Központjának alapító igazgatója elmondta, hogy bár a laboratóriumban a biofilmet alkotó szervezetek nem voltak mozgékonyak, a baktériumok és gombák kombinációja „szuperorganizmust” hozott létre: egy olyan csoportosulást, amelyet sokkal nehezebb volt eltávolítani a fogakról, mint bármelyik alkotóelemet önmagában.

A kutatócsoport eredetileg kisgyermekes súlyos gyermekkori fogszuvasodását tanulmányozta, amikor megdöbbenve tapasztalták, hogy a baktériumok és gombák keveréke valóban kifejlesztette a „járás” és az „ugrás” képességét, miközben korábban egyikük sem volt képes erre. A szóban forgó organizmusokat, a *Streptococcus mutans*-t és a *Candida albicans* gombát azonosították a kisgyermekes súlyos fogszuvasodását okozó biofilm fő alkotóelemeiként.



A Pennsylvanai Egyetem kutatói felfedezték, hogy a szájiüregi baktériumok gombákkal párosulva olyan organizmustípust hozhatnak létre, amely hihetetlen sebességgel mozog a fogakon, elősegítve a fogszuvasodást. (kép: AnalysisStudio/Shutterstock)

Dr. Zhi Ren, a laboratóriumban dolgozó posztdoktori munkatárs és a tanulmány egyik társszerzője a mikroszkópia egy olyan formáját használta, amely lehetővé tette a csapat számára, hogy valós időben megfigyelje a szervezetekben bekövetkező változásokat. A baktériumok és gombák képesek voltak váratlanul nagymértékű tapadást és mikrobiális toleranciát kifejleszteni. A gombák hifákat hajtottak, amelyek lehetővé tették a baktériumok számára, hogy jobban rögzüljenek és megakadályozzák az eltávolítást.

A biztonságos rögzülés ellenére az új összetétel még mindig képes volt előrehaladni, „mintha a baktériumok stoppolnának a gombákon” – mondta Prof. Koo. Ez a képesség azt jelentette, hogy miután az összeállítást laboratóriumi modellben emberi fogakon tesztelték, a biofilm a vártnál sokkal gyorsabban terjedt, mivel az organizmusok növekedésük során képesek voltak mozogni.

Az eredmények nemcsak a fogorvosoknak segíthetnek jobban megér-

teni, hogy milyen szintű megelőzésre van szükség a súlyos szuvasodás megelőzéséhez, hanem a klinikusoknak is segíthetnek megérteni a baktériumok elszaporodását az orvostudomány más területein.

A tanulmány, amelynek címe „Interkingdom assemblages in human saliva display group-level surface mobility and disease-promoting emergent functions”, a *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2022. október 11-i számában jelent meg. **DT**

IMPRESSZUM NEMZETKÖZI SZÉKHELY

FELELŐS KIADÓ ÉS VEZÉRIGAZGATÓ:
Torsten OEMUS

TARTALOMÉRT FELELŐS IGAZGATÓ:
Claudia Duschek

Dental Tribune International GmbH
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 4847 4302
Fax: +49 341 4847 4173
Általános információ: info@dental-tribune.com
Hirdetésfelvétel:
mediasales@dental-tribune.com
www.dental-tribune.com

A Dental Tribune International GmbH azon anyaga, amelyet újra nyomtattak vagy lefordítottak és újból kinyomtattak ebben a kiadásban a Dental Tribune International GmbH szerzői jogi védelme alatt áll. Az ilyen anyagokat a Dental Tribune International GmbH engedélyével lehet csak közzétenni. A *Dental Tribune* a Dental Tribune International GmbH védjegye.

Minden jog fenntartva. © 2022 Dental Tribune International GmbH. A Dental Tribune International GmbH előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon, egészben vagy részben történő sokszorosítása kifejezetten tilos.

A Dental Tribune International mindent megtesz annak érdekében, hogy a klinikai információkat és a gyártók termékeiről szóló híreket pontosan adja közre, nem vállal azonban felelősséget a termékekről szóló állítások helytállóságáért vagy a nyomdahiábáért. A kiadó nem vállal továbbá felelősséget sem a termékevevéért vagy -leírásokért, sem a hirdető közleményeiért. A szerzők által kifejtett véleményt a sajátjuknak kell tekinteni, és azok semmi módon nem tükrözik a Dental Tribune International véleményét.

dti Dental
Tribune
International

KIADJA: DP HUNGARY KFT.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.

FELELŐS KIADÓ: Laczkó Tamás

SAKAFORDÍTÓ: Laczkó Leonárd

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: DP Hungary Kft.

NYOMDAI KIVITELEZÉS:
Pharma Press Nyomdaipari Kft.

ADATEGYEZTETÉS, INFORMÁCIÓ:
Bárdos Veronika, 06-30-472-0030

HIRDETÉSFELVÉTEL: Laczkó Tamás,
06-30-472-0030

ISSN 1786-9889

Szemfog és kisőrlő formázása kismetsző aplázia részarással történő kezelése során

Szakirodalmi áttekintés

Dr. Ivana Dubovská,
Dr. Barbora Vágnerová,
Dr. Wanda Urbanová
(Csehország),
Dr. Veiszenbacher Éva,
Dr. Borbély Zoltán,
Dr. Borbély Péter
(Dr. Borbély Fogszabályozási
Stúdió, Budapest)

Absztrakt

A hiányzó oldalsó kismetszők részarással történő kezelése során a szemfogak és oldalsó fogak mezialis mozgataa közben a fogszabályozó orvosnak csiszolással kell a fogak formáját igazítani. Már a kezelés elejétől a szemfog elcsiszolása nem csak az incizális részre kell hogy kiterjedjen, hanem az approximális, palatinális és a vesztibuláris felszín éli negyedére is. Így érhetünk el egy rövidebb klinikai koronát, a vesztibulo-orális méret csökkenését, egy incizális élt, valamint a szemfog megfelelő pozicionálását a kismetsző helyén. A túl széles szemfog megakadályozza a megfelelő interkuspidáció kialakítását az oldalzónában. A palatinális felszín elcsiszolásával biztosítjuk az interferenciák nélküli metszővezetést, és a megfelelő overjetet a frontfogak enyhe érintkezésével. Ha a szemfogra a későbbiekben esztétikai pótlás készül, a megfelelő approximális elcsiszolás (az esztétikai fogorvossal történő egyeztetés után) biztosítja a zenith kívánatos pozícióját a későbbi felépítéshez. A mezializált kisőrlő palatinális csücskének elcsiszolására csak akkor van szükség, ha ez akadályozza a megfelelő fogérintkezést. Az első kisőrlő mindkét csücske fontos a már a szemfog helyén álló fog esztétikai és funkcionális beállításához.

Jelen beszámoló célja a fellelhető szakmai irodalom áttekintése, továbbá az eljárás klinikai lépéseinek bemutatása.

Kulcsszavak: szemfog-mezializáció, szemfogformázás, szemfogelcsiszolás, első kisőrlőformázás, első kisőrlő elcsiszolás, hiányzó oldalsó kismetsző (aplázia)

Bevezetés

A szemfog oldalsó kismetsző helyére történő bemozgatása során a fog átalakítása javasolt a két fog eltérő morfológiai adottságai miatt (**1. a-b ábra**). A fog kontúrozása, vagy úgynevezett formázása magába foglalja az approximális felszín elcsiszolását, valamint a többi fogfelszín igazítását a kívánt fogformának megfelelően [1].

A kismetsző és szemfog klinikai koronái közötti eltérések a következők:



ek: mezio-disztálisan keskenyebb oldalsó metsző, csücsök hiánya, egyenes éli lefutás, és a vesztibuláris felszín domborulata is kevésbé kifejezett [2,3]. A szemfoggal összehasonlítva, az oldalsó metsző rendszerint rövidebb és keskenyebb mind mezio-disztálisan, mind vesztibulo-orálisan. Az átfarmázott szemfog és az oldalsó metsző anatómiai alakja közötti egyezés függ az előző zóna mint egység formájától is. Kataoke és Nishimura három alapformát határozott meg az előző fogak tekintetében: négyszögletes, óvóid és háromszög formájú [4]. A frontfogak vesztibuláris felszínét a három kúp egységként írják le (kúpos fejlődési mamelonok): mezialis, disztális és centrális. A szemfogak esetén a három közül a központi a legdominánsabb, de nem ugyanez a helyzet az oldalsó metsző esetében. Háromszög alakú fogkorona esetén a mezialis és disztális érvénysül jobban, négyszögletes formánál mindhárom egyenlő arányban domborodik, míg óvóid forma esetén a középső kerül túlsúlyba. Ennek megfelelően a szemfog csücskét el kell csiszolni, és kompozit felépítéssel az előző anatómiai formához illő oldalsó metsző alakzatot kialakítani a szélső élek megfelelő hangsúlyozásával [5]. Amennyiben az előző fogak formája háromszögletes, akkor kifejezett mezialis és disztális felépítésekre lesz szükség. Négyszögletes forma esetén a szemfog meglévő centrális kúposágát kiegyensúlyozva építik fel a fogat. Az előző fogak ovoid alakzata esetén a mezialis és disztális kúposágot alig vagy egyáltalán nem hangsúlyozzák (amennyiben a szemfog formája csiszolás után megegyezik az oldalsó metszőfog kívánt alakjával). A szemfogaktól eltérően az oldalsó metszők palatinális felszíne konkáv mind mezio-disztális, mind apikokoronális irányban [6].

Figyelembe véve, hogy aplázias oldalsó metszők esetén általánosan megfigyelhető a fogak méretének csökkenése [7,8,9], egyes pácienseknek a szemfoga is kisebb lehet. Ezekben az esetekben nem mindig van szükség a fogak elcsiszolására, a szemfogakat



ilyenkor felépítésekkel formázzuk, amit gyakran a középső metszők és kisőrlők felépítése egészít ki.

Eszköztár

Az eszközöket két fő csoportra osztjuk: kézi- és forgóeszközök.

Kézieszközök - csiszoló csíkok

A csiszoló csíkok lehetnek tömörök vagy perforáltak, illetve egy- vagy kétoldalúak. Különböző durvaságú gyémántszeccsikkel vannak bevonva (kék - közepes szemcséjű 45 µm, piros - finom szemcséjű 30 µm, sárga - extra finom szemcsézettégű 15 µm). Ezek nem alkalmasak nagyobb mértékű elcsiszoláshoz vagy formázáshoz. Használatuk az approximális élek lekerekítésére és forgóeszközökkel hozzá nem férhető területek csiszolására korlátozott. Az oldalsó fogak formázásához való alkalmazásuk nem eléggé hatékony, időigényes, továbbá a zománcban érdes, mélyen barázdált és egyenetlen széleket hagynak hátra [11,1].

Forgóeszközök

A forgóeszközök közé tartoznak a keményfém-fúrók, gyémántszeccsikkel és gyémántkorongok. A keményfém-csiszolók funkcionális hegye finom szemcséjű karbidból készül volfrám-, kobalt- vagy acélalapon [1]. Eltérhetnek az élek számának függvényében (6, 10, 12, 32), illetve a tekercselésnek megfelelően (zöld - durva, kék - közepes, piros - finom, sárga - extra finom).

A gyémántcsiszolókat gyémántszeccsikkel vonják be, és ezeket a szemcseméret alapján lehet felosztani (fekete - extra durva - 151-213 µm, zöld - durva - 107-181 µm, kék - közepes - 64-126 µm, piros - finom 27-76 µm, sárga - nagyon finom - 10-36 µm, fehér - extra finom szemcsézettégű 4-14 µm). A passzív hegyű gyémántcsiszolók csökkentik az approximális élek kialakításának kockázatát [12], és megakadályozzák a lágyrészek sérülését. Ezek az elemek nem rugalmasak, ezért a lecsiszolt fogfelszínnek széleinek lekerekítése jó manualitást igényel [13].

A gyémántkorongok tömörök vagy perforáltak, és a felületüket gyémántszeccsikkel vonják be (fekete - nagyon durva - 180 µm, zöld - durva - 120 µm, kék - közepes - 100 µm, piros - finom - 30 µm, sárga - extra finom - 8 µm; perforált - 30 µm). Gyémántkorongokat Tuverson [14] és Zachrisson [15,16] alkalmazták a fogak átalakításához, melyet Sof-Lex korongokkal történő polírozás követ. Előnyük, hogy gyors redukciót biztosítanak, hátrányuk a megfelelő anatómiai forma kialakításához szükséges lekerekített élek elérésének nehézségében rejlik, ez a merev korongok és a lágyrészek sérülésének nagyobb rizikója miatt áll fenn.

Az oszcilláló mozgást végző speciális 60°-os gyémántkorongok, amelyek könyökdarabban rögzülnek, egy 30°-os tengelyben szintén alkalmazhatók. Két típusú szemcsézettégűk van: közepes és finom [1]. Előnyük a ritka lágyrész-sérülés, hátrányuk a hosszabb folyamat, továbbá szorosabb kontaktpontok esetén a vibrációk érzékelése a páciens által [12].

Az elcsiszolt felületek polírozásához az alábbiak alkalmazhatóak: keményfém-csiszolók közül piros (8-12), sárga (16-20) és fehér (30) jelzésűek, sárga és fehér gyémántfúrók és Sof-Lex korongok. A Sof-Lex korongok uretánnal bevont papír polírozó korongok 9, 13 és 16 mm átmérővel. A Sof-Lex XT és a korong egyharmada poliészterből készül. Felületüket különböző méretű alumínium-oxid kristályszeccsikkel borítják (sötét narancssárga - durva - 40-100 µm szemcsék, narancssárga - közepes - 9-40 µm, világos narancssárga - finom 3-9 µm, sárga - extra finom 1-3 µm) [17].

Az elcsiszolás és formázás klinikai kivitelezésének lépései

1. Tervezés

Már a kezelési tervezés fázisában meg kell határozni a zománc elcsiszolásának pontos mértékét az egyes fogak esetében [18]. Szemfog oldalsó metszövét való átalakítása vesszük alapul [19-22], vagy készíthetünk egy wax-upot. A beavatkozást megelőzően meg kell határozni a kívánt korona magasságát, azaz, hogy mennyit kell elcsiszolni a szemfog csücskéből, és milyen kiterjedésű felépítményre lesz szükség az incizális él kialakításához. Az optimális mezio-disztális szélesség kialakításával egyrészt elegendő helyet biztosítunk a kisőrlő megfelelő pozicionálásához a szemfog helyén

az okklúziós kulcsnak megfelelően, valamint a szükséges felépítésekhez.

2. Interproximális területek hozzáférhetősége

Az approximális felszín elcsiszolása előtt fontos kialakítani a megfelelő kontaktpontokat, ehhez pedig ki kell nyitni a fogívet, és meg kell oldani a rotációkat [23]. Ugyanakkor fontos a zenith ideális magassága és megfelelő angulációja. Az esztétikus fogorvos a fogkorona anatómiája és a zenith pozíciója alapján határozza meg a mezialis és disztális felszín elcsiszolásának mértékét. Mivel a középső metsző és a szemfog közötti kontaktpont nem ideális, ezért a szemfog tengelyét úgy kell beállítani, hogy az elcsiszolásokat követően a lehető legjobb érintkezést hozzuk létre a két fog között.

3. Lágyrészek védelme

Gyémántkorongok használatakor, a lágyrész sérülések megakadályozásához a négykezes technika vagy egyéb védőelem használata javasolt [16]. Kezdetben a papilla védelmére réz szeparáló drót vagy faék használatát javasolták [24]. Azonban ezt mára már elvetették, mivel megnyitják a kontaktpont területét, illetve a kismértékű papillasérülések nem okoznak fájdalmat a pácienseknek [18]. Napjainkban az inaktív hegygel rendelkező gyémántcsiszolók használata javasolt [12].

4. Fogközi elcsiszolás és formázás

Kismértékű elcsiszolással javasolt kezdeni, majd fokozatosan folytatni [25]. Az elcsiszolás mértékét egy speciális mérővel (approximális felszínéknél) vagy tolómérővel ajánlott ellenőrizni. Hasonló az eljárás az interdentalis felszín formázása esetén is. Piros gyémántfúrók [24], gyémántbevonatú [14] és oszcilláló mozgást végző korongok [26] javasoltak.

5. Kidolgozás és polírozás

A kidolgozás és polírozás eredményeképpen egy megfelelő morfológiájú, texturájú és a lehető legsimább fogfelszínt alakítunk ki. Az approximális élek lekerekítettek, és a megmunkálást sárga gyémántfúrókkal fejezzük be [15]. Finom gyémántszeccsézettégű vagy oszcilláló mozgást végző korongok, illetve polírozásra alkalmas keményfém-fúrók alkalmazhatóak a polírozáshoz. A végső finomításokhoz minden szerző Sof-Lex korongokat javasol [27, 18, 28-30].

6. Helyi fluoridálás

Egyes szerzők javasolják topikus fluoridkészítmények alkalmazását a csiszolást követően [31,32]. Zachrisson szerint [15, 33] fluoridtartalmú



3. a-b ábra: .019x.025" acél mint befejező fogszabályozóív vesztibuláris hajlításokkal a 11-13., a 21-23., valamint a 24-25. és a 14-15. fogak között.



4. a-b ábra: A szemfog palatinális felületének formázása (a, Rodentica 257) és polírozása narancssárga Sof-Lex koronggal (b). A bracketeket már eltávolították ezekről a fogakról.



5. a-e ábra: A szemfog proximális éleinek beállítása rövidebb túláng gyémántfúróval (Rodentica 465), továbbá hosszú tűkkel gyémánt láng (Rodentica 249) és hegyes láng gyémántfúróval (Rodentica 540). A bracketeket már eltávolították ezekről a fogakról.

fogkrém és szájbőltő használata esetén nincs szükség további fluoridzselé alkalmazására. Még egy kis mennyiségű folyadékban található fluorid is (0,03-0,08 ppm), amely kontaktusba kerül a zománcsal, remineralizációt eredményez, ez elnyomja a demineralizációt. [34].

Formázás – gyakorlati kivitelezés

A tanulmányunkban bemutatott javaslatokat Zachrisson, Rose és Mirabella előadásaira [35, 36,37] és a fellelhető irodalomra [14,38,39,41] alapoztuk. A megfelelő vízűtés al-

kalmazása rendkívül fontos része az eljárásnak. A szövegben megjelenő eszközök a Rodentica, Komet és 3M termékei.

Szemfogbecsiszolás

A szemfog elcsiszolásához piros gyémántfúró javasolt, finom szem-

csézettséggel, 27-76 μ m (okkluzálisan lekerekített – Rodentica, speciális hegyű 806314466514031, Komet 8833), gyorsítóval (max 160 000 fordulat/perc) megfelelő hűtés mellett, legalább 50 ml/perc. Ezt követi a felület kidolgozása és polírozása sárga gyémántcsiszolóval, extra finom szemcsézettséggel, 10-36 μ m (Rodentica 806314466504031) és narancssárga Sof-Lex korongokkal (finom alumínium-oxid szemcsék 3-40 μ m, extra finom, narancssárga-sárga, alumínium-oxid kristályok mérete 1,7 μ m) könyökdarabban (25000 fordulat/perc) megfelelő hűtés mellett min. 50 ml/perc (**2. a-d ábra**).

A szemfog megfelelő inklinációjának eléréséhez az oldalsó metsző helyén a palatinális felszínt is el kell csiszolni. Ennek a felületnek nem szabad interferenciát okoznia a harapásban, és lehetővé kell tennie a megfelelő metszőfog-vezetést [14]. A formázás előtt meg kell vizsgálni a szemfog vesztibulo-orális pozícióját. Lapos vesztibuláris felszínnel rendelkező szemfog esetén szükség lehet egy elsőrendű hajlításra a középső metsző és szemfog között (főleg, ha a szemfagon egy oldalsó metsző bracket van, melyben a beépített in-out érték magasabb) annak érdekében, hogy elérjük a megfelelő vesztibulo-orális pozíciót a fognyak szintjén, és elkerüljük a palatinális elcsiszolást (**3. a-b ábra**), [39].

Abban az esetben, ha a szemfognak kifejezettebb a központi lóbusa, a palatinális felszínről is el kell csiszolni, nem csak a vesztibuláris felszínről [40, 41]. A vesztibuláris felszín kifejezett elcsiszolása esetén ez már a dentint is érintheti, ami megnehezíti az esztétikai helyreállítást (a sárga dentin átüthet és a ragasztás is nehezebb ehhez a felülethez). Ezért a vesztibulárisan domború szemfogakat javasolt palatinálisabban pozicionálni, ami – együtt a nagyobb mértékű palatinális elcsiszolással – lehetővé teszi a felépítmény kiterjesztését a vesztibuláris felszínen és a központi lóbusa álcázását [39].

A zománc elcsiszolásának mértékét az orális és incizális felszínen a harapás határozza meg, ennek vizsgálatához tükröt és artikulációs papírt használunk [36]. Ideálisan, teljes interkuspidációban a frontális kontakt olyan enyhe, hogy az artikulációs papír kicsúszik, míg propulzióban, metsző fogvezetésnél a jelölésnek a palatinális felszín incizális harmadában kell lennie mind a középső metszőn, mind a szemfagon. A gyémánteszközök legalkalmasabb formája a palatinális elcsiszoláshoz a lándzsa és rögbi alakú (Komet 0640, piros finom lándzsa Rodentica 806314257514020 (max. 300 000 fordulat/perc), rögbi Rodentica 800314278514020 finom piros (27-76 μ m) gyorsítóban. Ezt követően könyökdarabba fogott Sof-Lex korongokkal szükséges polírozni (**4. a-b ábra**).

Szemfog mezializációt követően történik az approximális felszín igazitása. Elérjük a megfelelő me-

zio-disztális szélességet, és a kontaktpont incizális irányba helyeződik át. Ebben a fázisban mindig szükséges egyeztetni az esztétikai pótlást készítő fogorvossal a szükséges szemfogformáról és a későbbi felépítmény pontos helyzetéről. Az esztétikai fogorvosnak kell eldöntenie a mezialis és disztális felszín elcsiszolásának mértékét is. Az ideális mezio-disztális fogméretet arányok alapján határozzuk meg. Az oldalsó felszín elcsiszolására alkalmazott eszközöknek egyeneseknek kell lenniük (az elején), melyek alkalmasak a szemfog domborulatának elcsiszolására és az approximális felszín párhuzamosítására a fog tengelyével [38]. A legalkalmasabbak a keskeny, rövid, tűhegy alakú fúrók (speciális, rövid, piros tűhegyű Rodentica 806314465514016 (Komet 1385), sárga Rodentica 806314465504016), hosszú tűgyémánt (Komet 0574 és finom piros lándzsa alakú gyémánt Rodentica 806314249514009, extra finom sárga lándzsa alakú gyémánt Rodentica 806314249504009) és hegyes lándzsa (Rodentica sárga hegyes lándzsa 806314540504010, piros 806314540514010) max. 450000 fordulat/perc (**5. a-e ábra**). Zachrisson szerint az approximális felszíneket gyémántfúrókkal és háromszög alakú tűkkel (okkluzális kontúrozók) alakítjuk és kerekítjük le (Rodentica 466, Komet 8833), [42, 35], (**6. a-b ábra**). Így a pontszerű kontakt területek kiszélesednek. Ezt követi a bukkális és palatinális felszínnek megfelelő anatómiai formájának kialakítása. A lekerekítetlen élek megnehezítik a megfelelő pótlás elkészítését, valamint megnövelik a szuvasodás és parodontális érintettség veszélyét [33].

A javasolt eszközhasználati sorrend a következő: piros gyémántfúró (finom 27-76 μ m), sárga gyémántcsiszoló (extra finom, 10-36 μ m) gyorsítóban megfelelő hűtéssel (**5-6. ábra**). Alkalmazhatunk gyémántkorongokat vagy oszcilláló mozgásokat végző korongokat is. A polírozást Sof-Lex korongokkal vitelezzük ki (finom-narancssárga 3-40 μ m, extra finom – narancssárga-sárga, 1-7 μ m), [43,33], (**7. a-b ábra**). Az approximális felszín elcsiszolása több lépésben történik megfelelő vízűtés alkalmazásával és helyi fluoridálással.

Kisörlő becsiszolása

Ha a szemfog helyére mezializált kisörlő intrúziójára nincs is szükség, a palatinális csücsök akkor is akadályozhatja a harapást és a szemfogvezetést [44]. Ezekben az esetekben elcsiszoljuk a palatinális csücsköt (**8. a-b ábra**) piros gyémántcsiszolóval (finom, 27-76 μ m, éli formázóval – Rodentica speciális tűhegy 806314466514031, Komet 8833 vagy GD – lándzsa Rodentica 806314257514020, Komet 0640) gyorsítóban (max 160 000 fordulat/perc) vízűtés mellett, min. 50 ml/perc [39]. Extra finom sárga gyémántcsiszolóval polírozunk, 10-36 μ m szemcsézettséggel (sárga éli csiszoló Rodentica speciális tűhegyű 806314466504031, GD – sárga lándzsa alakú Rodentica

806314257504020) és narancs Sof-Lex korongokkal (3M finom, narancssárga alumínium-oxid kristály 3-40 μm nagysággal, extra finom, narancssárga-sárga, 1-7 μm alumínium-oxid kristályokkal) könyökdarabban (25 000 fordulat/perc) legalább 50 ml/min. hűtéssel. Az elcsiszolást több lépésben végezzük, és ezt helyi fluoridalkalmazás követheti.

Megbeszélés

A kutatások azt mutatják, hogy a fog nem sérül annak ellenére sem ahhoz, hogy a szemfogát átalakítsuk egy oldalsó metszőfoggá, és jelentős mennyiségű zománcot kell eltávolítani. Tuverson 0,4 mm zománc elcsiszolás mellett nem regisztrált sérülést a szemfogon [14]. *Fillion* [45,46] 0,6 mm approximális elcsiszolást javasol. Más tanulmányok szerint a kisórlók és órlók interproximális redukciójával – torlódás esetén – 6,4 mm [24] - 9,8 mm [47] helyet nyerhetünk, azaz a kisórlók területén a még biztonságosan elcsiszolható zománc mennyisége 0,5 mm. A kisórlók csücskén található zománc vastagsága 2-2,5 mm, és fokozatosan csökken a zománc-cement határig [48]. A disztális felszínen a zománc vastagsága kisebb, mint a mezialis felszínen, és nincs összefüggés a fog formája és a zománcréteg vastagsága között [49,50], az 50%-os zománc elcsiszolás még biztonságosnak tekinthető, és nem növeli a fogszuvasodás vagy parodontális betegség kialakulásának rizikóját [23]. Legalább 0,5 mm távolságnak kell lenni a gyökerek között az interradiális csont számára, és legalább 0,3 mm-t vesz fel az egészséges periodontális rostrendszer [51]. *Sheridan* szerint [24] a biztonságos elcsiszolás mértéke az oldalsó fogaknál 1 mm (0,5 mm az egyes approximális felszínekről) és 0,75 mm az alsó metszők területén. Mindig figyelembe kell vennünk a fogtípusonként változó zománcvastagságot, a felületek típusát és az etnikai hovatartozást [52,53].

Zachrisson és *Mjör* [38] 48 eltávolításra kerülő kisórlót vizsgáltak. Ezeket a fogakat átalakították, mint a hiányzó fog helyére mezializált szemfogakat. Ezt követően a kisórlőket értékelték 1 héttel, majd 5 hónappal az elcsiszolás után. Az eredmények szerint amennyiben a



6. a-b ábra: A proximális szemfogélek lekerekítése, okkluzális kontúr kialakítása (Rodentica 466).



7. a-b ábra: Polírozás narancssárga Sof-Lex koronggal.



8. a-b. ábra: A páciens a felső első kisórló palatinális csücskének elcsiszolása előtt (a) és (b) után, a szemfogvezetés kialakításához. A szemfog vesztibuláris felszínének befejezése.



csiszoláskor megfelelő a vízűtés és a módosított felszínnek öntisztulókká válnak, akkor ezt a formázást el lehet végezni anélkül, hogy a páciensnek ez kellemetlenséget okozna, továbbá alig vagy nem történik változás a pulpa és dentin területén. A szerzők ugyanezt igazolták a következő tanulmányukban is, ahol 37 kismetszővé átalakított szemfogakat vizsgáltak meg 10-17 évvel a csiszolás után [41]. Nem volt szignifikáns különb-

ség a csiszolt és csiszolatlan fogak között a mozgathatóság, kopogtatási vagy hőreakció szempontjából. Pulpaszűkületet találtak, de ennek más oka is lehetett. Mikroszkóp alatt vizsgálva mindössze két fog esetében figyeltek meg a gyémánt-csiszolók által hagyott barázdákat és karcolásokat, a többi fog állapota tökéletes volt. Fontos, hogy a zománc elcsiszolásnál figyeljünk a természetes fogformára, elsimított zománcfelszínre (mely biztosítja az

öntisztulást) és az elégséges vízűtésre [38].

Radlanski és mtsai. [54] beszámoltak róla, hogy a perforált korongok 30 μm szélességű és mélységű barázdákat hagynak hátra. Az elcsiszolt felületek extra finom Sof-Lex koronggal történő polírozása után is 10-30 μm mély vajatok maradnak. Ezekben a barázdákban felgyűlhet a plakk, még akkor is, ha a páciens fogselymet használ, és ez növelhe-

ti a fogszuvasodás előfordulásának gyakoriságát [55].

Joseph és mtsai. [32] szerint az elcsiszolás egyedüli hátránya a nem megfelelő felületi kidolgozás és polírozás. Amennyiben a zománcfelszín viszonylag sima a csiszolást követően, úgy nincs plakk felhalmozódás, és a zománc remineralizálódhat. *Zachrisson* bebizonyította, hogy az elcsiszolást követően azokon a területeken, ahol a plakk felgyűlhet, megnövekedik a fogszuvasodás előfordulása, azaz a durva, a rosszul polírozott és a nehezen tisztítható felületeken. A legnagyobb rizikót az egyenetlenül elcsiszolt approximális zománcfelszínnek jelentik [56]. Ezt a problémát megoldhatja az inaktívált végű fűrők használata [12]. *Zachrisson* 2,5%-os caries előfordulást jelentett az elcsiszolt felszíneken szemben a 2,4%-os gyakorisággal kezeltetlen felületeken [56]. *Kanoupakis* és mtsai. [57] Diagnodenttel dolgozva kezdetleges zománc elváltozásokat az elcsiszolt fogak 4,7%-ánál figyeltek meg 18-24 hónappal a beavatkozást követően. *Jarjoura* és mtsai. [58] három új interproximá-

Bracket típus	Indikáció	Roth torque	Roth anguláció	MBT torque	MBT anguláció	Standard edgewise torque/anguláció
Oldalsó metsző	VO keskeny, elcsiszolás után alkalmas	+8°	+9°	+10°	+8°	
Szemfog	VO széles, ha pozitív a torque érték	-2°	+10°	-7°	+8°	
Felcserélt szemfog	VO széles, ha pozitív korona torque szükséges	+2°	+10°	+7°	+8°	
Szemfog 0° torque értékkel	VO széles, ha nem kell torque			0°	+8°	0°/0°
Felcserélt alsó második kisórló bracket	VO széles, ha kifejezett pozitív torque-ra van szükség	+22°	0°	+17°	+2°	

1. táblázat: Kismetsző helyére mezializált szemfog bracket kiválasztása. VO – vesztibulo-orális dimenzió.

lis lézió megjelenését jelentették 376 fogfelszín vizsgálva, 1-6 évvel a csiszolást követően. Nem találtak különbséget a caries incidenciában csiszolt és csiszolatlan fogfelszínek között [59,60,61,15,58,41,56]. In vitro az elcsiszolt zománc nagymértékű demineralizációt mutat [62,31], azonban in vivo ezt kiegyensúlyozza a természetes remineralizáció [61]. Azt is bebizonyították, hogy a zománc ásványi anyag tartalma nem változik [28]. Ezért feltételezhetjük, hogy a megfelelően kialakított és kellően polírozott palatinális és vesztibuláris zománcfelszínek nem jelentenek kockázatot sem a szemfog, sem pedig a kisírló esetében.

Különböző szerzők más és más eszközhasználati sorrendet javasoltak a legsimább zománcfelszín eléréséhez. *Hein* és mtsai. [63] finom szemcsézettségű gyémántkorongokkal indítanak, így a kezdeti barázdák nem lesznek olyan mélyek, és könnyebb a felületet polírozni. 60 másodpercig tartó Sof-Lex korongos polírozás simább zománcfelszínt alakíthat ki, mint a kiindulási felület. *Zhong* és mtsai. [18] az oszcilláló mozgást végző perforált korongokat részesítik előnyben kisebb mint 30 µm-es szemcsenagysággal, a polírozást finom és extra finom Sof-Lex korongokkal végzik 40 másodpercig, megfelelő vízhűtés mellett. *Szostkova* szerint a perforált

gyémántkorongokkal vagy abrazív csiszoló csíkokkal végzett zománc elcsiszolás polírozás nélkül helytelen [1,73]. Abban az esetben, ha piros és sárga gyémántkorongokat alkalmaztak polírozás nélkül, akkor a sárga csiszoló lekerekítette a piros által hátrahagyott barázdák éleit. Ez az eljárás nem változtatott a vajatok számán vagy mélységén [1,73]. *Szostkova* eredményei alapján csak azok a zománcfelszínek voltak megfelelően polírozva, ahol Sof-Lex korongokat alkalmaztak. A Sof-Lex korongok használata után a barázdák sekélyek voltak, lekerekített végekkel, egyes helyeken a zománcban nem voltak vajatok, vagy csak olyan jellegűek, amelyek kezeletlen zománcfelszíneken is természetesen előfordulnak [1,73]. Annak érdekében, hogy a lehető legsimább zománcfelszínt érjük el, az elsődleges csiszolás utáni barázdák száma rendkívül fontos. Minél durvább a zománcfelület, annál nehezebb azt tökéletesen kidolgozni és elsimítani [25]. Az érdes zománcfelszín tökéletes elsimítása lehetetlen feladatot jelenthet [28,29,30,54,64,65,66]. Minél finomabb az alkalmazott korong és kisebb szemcsézettségű a gyémántcsiszoló a megmunkálás elején, annál könnyebb, gyorsabb és jobb a zománc polírozása [15,18,27,63]. Azok az eljárások, amelyek keményfém-csiszolókat [27,67], gyémántfűrőket és korongokat [63,67], illetve

oszcilláló mozgást végző korongokat [18] alkalmaznak, melyet Sof-Lex korongos polírozás követ, simább zománcfelszíneket tudnak kialakítani, mint a természetes zománcfelület [18,29,30,64,68,69]. A nagyobb átmérőjű Sof-Lex korongok, approximális felszínenként új korongok alkalmazása és a hosszabb polírozási idő ideális eredményt biztosít [18]. A polírozás fontosságát több tanulmány is kimutatta [28,29,30,54], ahol a polírozás minden esetben csökkentette a felület durvaságát. A lehető legsimább zománcfelszín kialakításán kívül egy másik fontos célja az elcsiszolásnak a teljes beavatkozás hatékonysága [1], azaz, hogy elérjük a legsimább felületet a lehető legrövidebb idő alatt, és minél kevesebb eszköz használatával. Ezt nagyban befolyásolja az eszközök elhasználódottsága és a választott technika, így a nyomás mértéke, az abrazív szemcsék keménysége és mérete, a csiszolás időtartama, valamint foghoz kötött tényezők, mint a zománc keménysége [70]. A vékonyabb és rugalmasabb eszközök fokozottabb abrázíós elhasználódást mutatnak, mint a durvább csiszoló felületek [71]. Minél szélesebb és keményebb a csiszoló eszköz, annál jobb az erő eloszlása a zománcfelszínen [72]. Az eszközök helytelen alkalmazása, mint például túl nagy nyomás használata és szűk kontaktokba való bepréselése, az eszközök de-

formációját és abrázíós hatékonyság csökkentését eredményezi [70]. Ezért az eszközöket gyakran kell ellenőrizni és cserélni.

Marek szerint [11] a zománc elcsiszolás ideális szekvenciája: három gyémántkorong alkalmazása durva - közepes - extra finom. Az extra finom korongokkal való megmunkálás után voltak a legkisebbek a barázdák, mert ezek mérete megegyezik az eszköz szemcseméretével. Ez a folyamat azonban időigényes, és így alkalmatlan a klinikai gyakorlatban. 30 µm-es szemcsenagyságú perforált korongok használata, melyet az extra finom gyémántkorong és két Sof-Lex korongos polírozás követ, a természetesnél is simább zománcfelszín eredményeznek. A szerzők szerint ez a leghatékonyabb eljárás. *Szostkova* [73] ugyanerre a következtetésre jutott, számára a leghatékonyabb elsőnek a piros gyémántcsiszoló használata, melyet két Sof-Lex korongos polírozás követ. A szemfog oldalsó metszővé való átalakításában a gyémántkorongok alkalmazása nem elég hatékony, mivel a felületeket az oldalsó metsző formájának megfelelően kell kialakítani, és erre a gyémántcsiszoló sorozat javasolt [28,38,67,74]. Ezek formája segít létrehozni az ideális lekerekítettséget és a sima átmeneteket. A legjobb sorrend: piros gyémántcsiszolóval levenni a szükséges zománcmennyiséget, sárgával lekerekíteni, majd megmunkálni

és polírozni Sof-Lex korongokkal [18,27,28,29,30].

Következtetés

A kismetsző helyére mezializált szemfog elcsiszolása, ha helyesen végezzük el, egy rövidebb szemfog eredményez, incizális él kialakításával, a vesztibulo-orális és mezio-disztális méretek csökkentésével az oldalsó metszőfog alakjának megfelelően. Így biztosított a metszőfog-vezetés interferenciák nélkül, megfelelő horizontális lépcső enyhe frontfog érintkezéssel, továbbá a kívánt zenith pozíció a későbbi felépítéshez. A kisírló palatinális csücskének elcsiszolására csak akkor van szükség, ha a csücsök gátolja a dinamikus okklúziót. Ily módon biztosított a szemfog-vezetés. A helyes formázás lehetővé teszi a fogazat funkcionális és esztétikai helyreállítását. A csiszoló eszközök javasolt sorrendjének betartása, melyet a megfelelő vízhűtés mellett végzett polírozás egészít ki, a figyelemmel követett fog- és zománcmorfológia olyan sima zománcfelszínt eredményezhet, mely képes az öntisztulásra, és így nem növeli a caries veszélyét, valamint nem károsítja a fogat.

(A cikk során felhasznált irodalom jegyzéke a szerkesztőségünkben megtalálható.)

hirdetés



30
DENTART
TECHNIK

FOGTECHNIKAI TERMÉKEK TELJES PALETTÁJÁT KÍNÁLJUK PARTNEREINKNEK

www.dentarttechnik.hu



Implantológiában és csontpótlásban az első!

Virtuális terezés

Ti és CoCr 3D nyomtatása

Egyéni implantátumok






Egyedi titán zsalúhálók

Csontpótlás

Csontpótlás eszközei

Implantológiai fűrősablonok

Műtéti segédeszközök



bmc
BONE MATRIX GELATIN

9024 Győr, Csokonai u. 10.

labor@dentarttechnik.hu

www.dentarttechnik.hu

+36 30 682 3827

Skócia-szerte tesztelik a fogorvosok a fogszuvasodást azonosító mesterséges intelligencia programot

Anisha Hall Hoppe,
Dental Tribune International

hirdetés

Úttörő tanulmányt végeznek a skóciai Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) és a nem NHS fogorvosi rendelőkben, amelyben a mesterséges intelligencia (AI) által vezérelt szoftver segít a szakembereknek a fogszuvasodás hatékonyabb felkutatásában. Az AssistDent nevű programot a Manchester Imaging fejlesztette ki, amely az Egyesült Királyságban a Manchesteri Egyetem fogorvostudományi és képzőképző tudományok közötti együttműködésből létrejött spin-off cég.

A korai felismerést célzó AssistDent gépi tanulási algoritmusokat használ a fogászati röntgenfelvételek kiértékelésére, hogy észrevegye vagy megerősítse a potenciális, csak zománcot tartalmazó proximális szuvas területeket. A fogszuvasodás korai felismerésével a páciensek megelőzéssel, például fluoridos kezelésekkel elkerülhetik a töméseket. A Skóciában több mint félmillió beteget ellátó, több mint 65 rendelőt és 200 fogorvost foglalkoztató Clyde Munro Dental Group kísérleti teszt keretében öt, Skóciában található fogorvosával alkalmazza az AssistDentet. Fiona Wood, a Clyde Munro operatív igazgatója a következőképpen magyarázta a mesterséges intelligencia mint a megelőzés hatékony eszközeinek használatát: „Mindig a megelőzés a célunk – és ez a technológia képes támogatni fogorvosainkat abban, hogy még a kialakulás előtt felismerjék a fogszuvasodás korai jeleit, és a szükséges megelőző ellátást a megfelelő fogakra irányítsák. Az AI hasznos eszköz arra, hogy megmutassa és demonstrálja a pácienseknek azokat a területeket, ahol fogászati igény vagy aggodalom merül fel, hogy a páciensnek esélyt adjon arra, hogy a Clyde Munro fogorvosainak támogatásával visszafordítsa a zománcelváltozásokat.”

Az AssistDent képességeit a British Dental Journalban közzétett, a Manchesteri Egyetem fogorvosi karának szakértői által végzett, szakértői által lektorált kutatásban értékelték. A tanulmányban az AssistDentet használó csoport 24 harapás-röntgenfelvételen a szakértő fogorvosok által korábban azonosított szuvasodás 76%-át találta meg, míg az AI-szoftvert nem használó csoport a problémás területek 44%-át. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az AssistDent jelentősen javítja a fogorvosok képességét a csak zománcot érintő proximális szuvasodás azonosítására. A 2019-es Global Burden of Disease tanulmány és az Egészségügyi Világszervezet szerint a kezeletlen fogszuvasodás a világ népességének 44%-át, mintegy 3,5 milliárd embert érint, és ezzel ez a leggyakoribb betegség a közel 300 értékelte állapot közül. **DT**



Kép: shmai/Shutterstock



Nyomtatott magazinok



Dental Hírek
4 szám/év



Fogtechnika
4 szám/év



Implantológia
3 szám/év




Digitális Fogászat
1 szám/év



Dental Tribune
4 szám/év

2023
DENTAL
PRESS
AKCIÓ!



Szakkönyvek ajándékba!

2023-as éves, mind az öt magazinunkra történő előfizetés esetén választhat fogászati szakkönyveink közül egyet ajándékba

bankkártyás
fizetés esetén





Az NHS England által nemrégiben közzétett jelentés szerint az elmúlt években megdöbbentő mértékben csökkent az NHS fogászati szolgáltatásait igénybe vevő betegek száma. (Kép: LunaKate/Shutterstock)

Aggasztó fogászati statisztikák Angliában

Iveta Ramonaite,
Dental Tribune International

hirdetés

Augusztus végén a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) közzétette az éves fogászati statisztikákat Angliára vonatkozóan. A jelentés a 2022 márciusáig tartó 12 hónapos időszakra vonatkozóan nyújt tájékoztatást az NHS fogászati tevékenységéről az országban, és tartalmazza az NHS fogorvosok által 2022 júniusának végéig ellátott betegek számáról szóló adatokat.


A SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az angliai fogorvosi rendelőket arra utasították, hogy 2020. március 25-től zárjanak be, és csak sürgősségi ellátást nyújtsanak, amíg a kormány be nem jelentette, hogy 2020. június 8-tól újra megnyithatnak. A jelentés szerint a 2022. március 31-ét megelőző 24 hónapban mindössze 16,4 millió felnőtt (34%) vette igénybe az NHS fogászati ellátást. Hasonlóképpen 5,6 millióra (44,8%) csökkent az NHS fogorvos által felkeresett gyermekek száma. A Brit Fogászati Szövetség (BDA) szerint a világjárványt megelőző utolsó teljes évben 48,6%, illetve 58,7% volt ez az arány. Emellett az adatokból kiderült, hogy 2021 és 2022 között mindössze 26,4 millió NHS-rendelésre került sor, míg a világjárványt megelőző öt évben átlagosan 39,4 millió fogászati kezelésre került sor évente. Sajnálatos módon, bár a fogorvosoknak idén áprilistól a pandémia előtti tevékenységük 100%-át kellett elvégezniük, a BDA megjegyezte, hogy a kiszabott célok nem eredményezték az NHS fogászati ellátások mennyiségének növekedését.

Az NHS egyre súlyosbodó válsága és fenyegető halála

A karantén időszak kezdete óta az NHS óriási beteghátalékkal küzd a fogorvosi szolgáltatások korlátozott hozzáférhetősége miatt. Az NHS fogorvosi válság valódi mértékére rávilágítva a BBC által nemrégiben végzett kutatás arról számolt be, hogy tízből kilenc NHS-rendelő közölte, hogy nem tud új felnőtt pácienseket fogadni. A BDA a közelmúltban Angliára vonatkozó fogászati statisztikákra reagálva megjegyezte, hogy az ország fogászati szolgáltatásainak reformja érdekében sürgős radikális változtatásra van szükség.

„Az NHS fogászat fényévekre van attól, ahol lennie kellene. Hacsak a miniszterek nem lépnek fel, és nem hajtják végre a nagyon szükséges reformot és a megfelelő finanszírozást, ez marad az új normális állapot” – mondta sajtóközleményében Dr. Eddie Crouch, a BDA főigazgatói bizottságának elnöke. ^[1]

Online magazinok



16 újság + 16 e-Journal

41 000 Ft
helyett

-45% 23 500 Ft

Előfizetés megrendelése:
www.dental.hu