



ΕΠΕΑΕΚ 2054/2016 ΚΕΜΠ Α.Ο.

DENTAL TRIBUNE

The World's Dental Newspaper | Greek Edition



ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

www.dental-tribune.gr



ΤΟΜΟΣ 11, ΤΕΥΧΟΣ 54

ORTHOTRIBUNE

The World's Orthodontic Newspaper | Greek Edition | Τόμος 3_Τεύχος 3

❖ σελίδα 17 - 24

Εν Συντομία

Τα βλαστοκύτταρα αναπτύσσονται σε μεταλλικοποιημένους ιστούς

Σε μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Periodontology χαρακτηρίστηκαν οι μεταλλικοποιημένοι ιστοί που δημιουργούνται σταθερά σε έντονα συνδυαστικά ανοσοκατεσταλμένους (ΕΣΑ) ποντικούς από έναν αρχέγονο κυτταρικό πληθυσμό βλαστοκυττάρων (ανθρώπινα βλαστοκύτταρα στοματικού βλεννογόνου (ΑΒΣΒ) που λήφθηκαν από τη lamina propria του ανθρώπινου στοματικού βλεννογόνου και των ούλων.

Τα ινώδη παράγωγα από ΑΒΣΒ καλλιεργήθηκαν για 14 ημέρες και στη συνέχεια αναλύθηκαν για την έκφραση οστεοβλαστικών/οστεϊνοβλαστικών δεικτών και εμφυτεύθηκαν μεταξύ του δέρματος και των επιμικών οστών σε ΕΣΑ ποντικούς.

Μετά από 8 εβδομάδες, τα πειραματόζωα θανατώθηκαν και αναλύθηκαν τα σημεία εμφύτευσης. Από τη μελέτη βρέθηκε πως οι καλλιέργειες δύο εβδομάδων των ινωδών παραγώγων ΑΒΣΒ εξέφρασαν οστεοκλαστικούς/οστεϊνοκλαστικούς δείκτες σε γονιδιακό επίπεδο.

Η μακροσκοπική και ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε μεταλλικοποιημένες μάζες στα σημεία εμφύτευσης των παραγώγων.

Η ιστολογική, ανοσοϊστοχημική και εξέταση ανοσοφθορισμού έδειξαν μεταλλικοποιημένες μάζες που αποτελούνταν από μη αγγειοβριθείς και ακυτταρικούς σκελετούς που χρωματίζονταν θετικά για κολλαγόνο, ασβέστιο, πρωτεΐνη πρόσφυσης οστεΐνης, πρωτεΐνη οστεΐνης 1, οστική σιαλοπρωτεΐνη, αμελογενίνη και αμελοβλαστίνη.

Το θετικό αντιανθρώπινο πυρηνικό αντιγόνο έδειξε την ανθρώπινη προέλευση των κυττάρων. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο απεικόνισε επιμήκεις πρισματικές δομές οργανωμένες σε δομημένα ιστολογικά αθροίσματα.

Οι συγγραφείς καταλήγουν πως δεδομένων των περιορισμών της μελέτης, τα αποτελέσματα δείχνουν για πρώτη φορά πως τα ινώδη παράγωγα ΑΒΣΒ διαθέτουν δυνατότητα ανάπτυξης σε μεταλλικοποιημένους ιστούς που εμφανίζουν ορισμένες ομοιότητες με την οστεΐνη και το οστό.

Κλινικά Θέματα



Προσωρινές αποκαταστάσεις για βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα

Μία σωστή αισθητική και λειτουργική διάγνωση, μαζί με ένα κατάλληλο σχέδιο θεραπείας καθώς και προσεκτική επιλογή και χρησιμοποίηση υλικών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχημένη επανορθωτική αποκατάσταση.

❖ σελίδα 4

Πρακτικά Θέματα



Εξατομικευμένοι διαστρωματικοί προστατευτικοί αθλητικοί νάρθηκες

Οι επιπτώσεις τραυματισμού του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος στην ποιότητα ζωής του αθλούμενου δεν είναι μόνο σωματικές αλλά υπάρχουν κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις.

❖ σελίδα 30

35° Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο
Συνέντευξη με τον κ. Ιατρού στην Omnipress

Καθηγητής
Ιωάννης Α. Ιατρού
Διευθυντής Κλινικής
Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής
Οδοντιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Το 35° Πανελλήνιο οδοντιατρικό Συνέδριο διεξάγεται φέτος στη Ρόδο στις 9-11 Οκτωβρίου σε συνεργασία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λωδεκανήσου.

Η Omnipress έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί στις σελίδες του Dental Tribune συνέντευξη του επιστημονικού υπευθύνου του συνεδρίου, γνωστού και καταξιωμένου καθηγητή κ. Ι. Ιατρού.

→ DT σελίδα 2

ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑAOS
201620-22
ΜΑΪΟΥΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λεωφ. Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι

HELEXPO MAROUSI

35th INTERNATIONAL
ATHENS DENTAL
SYMPOSIUM

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Ed McLaren (USA) - Joseph Choukroun (France) - Leandro Pereira (Brazil)
David Gerdolle (Switzerland) - Andrea Ricci (Italy) - Marco Ronda (Italy) - Francesco Amato (Italy)
Chriskan Makary (Lebanon) - Dimitris Tatakis (USA) - Aris Tripodakis (GR) - Iliia Roussou (GR) - Spyros Floratos (GR)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γιώργος Γούμενος, Στρατής Παπάζογλου



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πληροφορίες - Εγγραφές:

τηλ: 210-2222637, 6972036900,

email: info@omnicongresses.gr, web: www.omnicongresses.gr

Γεώργιος Γούμενος, BScPharm, DDS, MS, DrOdont
Egon Euwe, DDS

31/10 - 1/11 2015, Αθήνα

Επιπλοκές και αποτυχίες των εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη

Θεματολογία:

- 1) Διαγνωστική μεθοδολογία και εκτέλεση σχεδίου θεραπείας για ορθή τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη
- 2) Αισθητικά προβλήματα στην Εμφυτευματολογία και αιτιολογία τους
- 3) Διαφοροποίηση της αποτυχίας από την επιπλοκή
- 4) Διαχείριση των αισθητικών προβλημάτων στην Εμφυτευματολογία με χειρουργικά και προσθετικά μέσα
- 5) Οστεοενσωματωμένο εμφύτευμα με αισθητικό πρόβλημα: Θεραπεία, κάλυψη (submerging), ή εξαγωγή του;
- 6) Εξαγωγή οστεοενσωματωμένου εμφυτεύματος και διαχείριση των οστού και των μαλακών ιστών μετά την αφαίρεση του
- 7) Προβολή Video

Hands on:

- 1) Άσκηση σε γνάθους χοίρων
- 2) Ατραυματική εξαγωγή οστεοενσωματωμένου εμφυτεύματος και διαχείριση της ακροδοφίας με συνδυασμό οστικού μοσχεύματος και επιθηλιοποιημένου μοσχεύματος συνδετικού ιστού
- 3) Τοποθέτηση μοσχεύματος συνδετικού ιστού με την τεχνική του tunneling, για κάλυψη υφίξεων σε εμφυτεύματα

Περιεχόμενα:

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν την διαγνωστική μεθοδολογία, ώστε να προλάβουν την εμφάνιση προβλημάτων, μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη. Επι πλέον, θα είναι σε θέση να επιλέξουν ανάμεσα στην δυνατότητα αποκατάστασης, ή απομάκρυνσή τους. Η εξαγωγή εμφυτεύματος θα παρουσιαστεί διεξοδικά καθώς και οι τεχνικές διαχείρισης της ελλειμματικής περιοχής. Τέλος θα συζητηθεί το πρόβλημα της υφίξεσης στα εμφυτεύματα και θα αναλυθεί η δυνατότητα αποκατάστασης της.



Κόστος
Συμμετοχής
390,00€

Διοργάνωση: **OMNI CONGRESSES**

Για πληροφορίες - εγγραφές: Τηλ.: 210 222 2637, 210 213 2084
e-mail: info@omnicongresses.gr | web: www.omnicongresses.gr

Χορηγοί:

Impladent 3i
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Nobel Biocare

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

INTERMED

PlacControl
Γραμμή Επιδερμικής Τραυμάτισης

Hu-Friedy
How the best perform

INTERTRADE

Pierre Fabre

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Προσωρινές αποκαταστάσεις για βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα



Dr. Christopher CK Ho

Ο Dr. Christopher CK Ho παρουσιάζει ένα περιστατικό όπου χρησιμοποιήθηκαν προσωρινές αποκαταστάσεις για τη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος σε σύνθετα επανορθωτικά περιστατικά

Η αισθητική αποκατάσταση ασθενών με λειτουργικά υποβαθμισμένη οδοντοφυΐα συχνά περιλαμβάνει μία πολυδιάστατη προσέγγιση, όπου περιλαμβάνονται αρκετές θεραπευτικές μέθοδοι. Μία σωστή αισθητική και λειτουργική διάγνωση, μαζί με ένα κατάλληλο σχέδιο θεραπείας καθώς και προσεκτική επιλογή και χρησιμοποίηση υλικών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχημένη επανορθωτική αποκατάσταση. Στο ακόλουθο περιστατικό παρουσιάζεται μία πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση για την αναδημιουργία ενός αισθητικού χαμόγελου σε μία γυναίκα ασθενή με λειτουργικά και αισθητικά υποβαθμισμένη οδο-

ντοφυΐα. Οι ασθενείς που χρειάζονται προσθετική αποκατάσταση συχνά εμφανίζουν πολλούς προβληματισμούς (αισθητικούς, λειτουργικούς και υγείας) και αναβάλλουν την αποκατάσταση λόγω φόβου, οικονομικών και χρονικών περιορισμών. Ο στόχος της θεραπείας είναι να παρέχουμε μία αισθητική και λειτουργική οδοντοφυΐα με ελάχιστη συντήρηση μακροπρόθεσμα.

Θεραπευτικός σχεδιασμός και επεμβάσεις

Ο κύριος στόχος ήταν η δημιουργία ενός αισθητικού χαμόγελου και η διαμόρφωση μίας λειτουργικής σύγκλεισης. Αυτό θα περιελάμβανε ορθοδοντι-

κή, περιοδοντική και επανορθωτική θεραπεία.

Περιοδοντική θεραπεία: Η ασθενής υποβλήθηκε σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο θεραπείας που περιελάμβανε οδοντικό καθαρισμό και βελτίωση της στοματικής υγιεινής.

Ορθοδοντική θεραπεία: Για να διορθωθούν οι μετατοπίσεις των κάτω δοντιών που αποτελούσαν συνέπεια της απώλειας δοντιών.

Διαγνωστικό κέρωμα: Αυτό επιτρέπει στην θεραπευτική ομάδα την προεπισκόπηση της επιθυμητής αισθητικής εμφάνισης. Το διαγνωστικό κέρωμα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές της επιθυμητής θεραπείας και ένα σημείο αναφοράς για τις τελικές αποκαταστάσεις. Το κέρ-

ωμα επιτρέπει, επίσης, την κατασκευή κλειδιών σιλικόνης για προσωρινές αποκαταστάσεις και οδηγούς αφαίρεσης οδοντικών ιστών για τη διαδικασία των οδοντικών παρασκευών.

Ουλική αναδιαμόρφωση: Χρησιμοποιήθηκε διοδικό laser 940nm για βελτίωση της αισθητικής των μαλακών ιστών. Πραγματοποιήθηκε περιοδοντική εξέταση για να βεβαιωθείτε πως δεν υπήρχε προσβολή του βιολογικού εύρους και οι ουλικοί ιστοί διαμορφώθηκαν με laser για βελτίωση της ουλικής μορφολογίας, συμμετρίας και των ουλικών παρυφών.

Οδοντικές παρασκευές: Για ολοκεραμικές στεφάνες προτείνεται αξονική ταπείνωση 0.8-1χιλ.

και μασητική ταπείνωση 2 χιλ. καθώς τα συγκεκριμένα υλικά απαιτούν συγκεκριμένο πάχος για να αντέχουν στις μασητικές και παραλειτουργικές φορτίσεις. Τα όρια προτείνεται να διαμορφωθούν τοξοειδούς λοξοτόμησης ή αποστρογγυλεμένα βάρη 90 μοιρών για να παρέχουν επαρκή όγκο στα όρια και να επιτρέπουν τη μεταφορά των φορτίσεων επαρκώς γύρω από τα όρια. Για να ελαχιστοποιηθεί η συσσώρευση φορτίσεων εντός της αποκατάστασης, όλες οι ακμές γωνιών θα πρέπει να είναι αποστρογγυλεμένες, όλες οι οξύαιχμες γωνίες θα πρέπει να λειανθούν, ενώ αντενδείκνυνται τα κιβωτίδια, οι αύλακες και τα διαμορφωμένα βάρη.

Η "δοκιμαστική" διαδικασία

Διαδικασία αποτύπωσης: Τοποθετήθηκε διπλό νήμα απώθησης ούλων στην ουλοδοντική σχισμή και ακολούθησε η τοποθέτηση πάστας απώθησης ούλων επάνω από το νήμα. Η σωστή χρήση αυτής της πάστας απώθησης ούλων θα πρέπει να συνδυάζεται με λεύκανση των ουλικών ιστών καθώς η πάστα εξωθείται στην ουλοδοντική σχισμή. Λήφθηκε αποτύπωμα με βινυλπολυσιλοξάνη.

Διαγνωτικές καταγραφές: Το σύστημα Ανάλυσης Οδοντοπροσωπικών δεδομένων Koīs καταγράφει και μεταφέρει το μα-

→ DT σελίδα 6



Εικ. 1. Φωτογραφία του χαμόγελου όπου φαίνεται η ασυμμετρία, η απόκλιση των άνω δοντιών, η παρέκκλιση της μέσης γραμμής, ο αρνητικός παρειακός διάδρομος και οι πληγμελείς αξονικές αποκλίσεις των δοντιών



Εικ. 2. Κοντινή πρόσθια φωτογραφία



Εικ. 3. Ορθοδοντική θεραπεία για ευθυγράμμιση των δοντιών που εμφανίζουν μετατόπιση και τη διόρθωση του μασητικού επιπέδου



Εικ. 4. Ολοκληρωμένη ουλική αναδιαμόρφωση

VITA

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με το παρόν βεβαιώνεται ότι η κάτωθι εταιρεία: **ESTETIKA ΜΕΠΕ**
Φειδιππίδου 41, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα
www.estetika.gr

Ορίζεται εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της εταιρείας VITA Zahnfabrik GmbH σε όλη την Ελλάδα. Με μεγάλη μας ικανοποίηση βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία ESTETIKA ΜΕΠΕ θα ξεκινήσει συνεργασία με τη Γερμανική εταιρεία VITA Zahnfabrik GmbH και θα είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της VITA σε ολόκληρη την Ελλάδα από την 1η Ιουνίου 2015.

Με εκτίμηση
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG



Jürg Weber
Sales Manager Central & SE
Europe

Η εταιρεία VITA Zahnfabrik GmbH Γερμανίας και η εταιρεία ESTETIKA ΜΕΠΕ Ελλάδας προσφέρουν μία νέα συνεργασία στο χώρο του Οδοντιατρικού εμπορίου.

Bad Saeckingen, Γερμανία και Αθήνα, Ελλάδα, 1η Ιουνίου 2015: Η εταιρεία VITA Zahnfabrik GmbH, ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς στις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις και η εταιρεία ESTETIKA ΜΕΠΕ, μία εταιρεία μέλος ενός ομίλου εταιρειών με την πιο μακροχρόνια παρουσία στη διανομή οδοντιατρικών προϊόντων και εξοπλισμού στην Ελλάδα, ανακοινώνουν σήμερα τη συνεργασία τους με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των οδοντιατρικών υλικών για την καθημερινή κλινική πράξη.

Οδοντιατρικά συστήματα – Μία αυξανόμενη τάση στην Ευρώπη

Στο παρελθόν, η εταιρεία VITA Zahnfabrik στόχευε αποκλειστικά στη χρωματολήψια και την αναπαραγωγή του χρώματος, ενώ τώρα η εταιρεία VITA είναι κατασκευαστής και πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

VITA Zahnfabrik και ESTETIKA ΜΕΠΕ μία συνεργασία με πολλά πλεονεκτήματα για την Ελληνική Αγορά.

“Ως υπεύθυνος κατασκευαστής η VITA δεν μπορεί να αγνοήσει τις εξελίξεις και τις αλλαγές της Ελληνικής Αγοράς. Κατέχουμε μία ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά σε συνεργασία με ένα δίκτυο διανομέων και συνεργατών εκπαίδευσης. Η εταιρεία ESTETIKA ΜΕΠΕ μοιράζεται τα οράματα και τις αξίες μας και μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με ένα ακόμα μεγαλύτερο αριθμό οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών στην Ελλάδα”, είπε ο Jürg Weber – Διευθυντής πωλήσεων Κεντρικής και Ν.Α. Ευρώπης.

Η συνεργασία μας θα ενισχύσει τη σχέση οδοντιάτρου, οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και του διανομέα μας, ώστε να βελτιώσει το επίπεδο παραπομπών ασθενών σε ειδικούς και τον συντονισμό των σχεδίων θεραπείας. Η προσέγγιση αυτή θα αυξήσει τη χρήση υλικών κατασκευής όψεων και τις λύσεις CAD/CAM για όλους τους επαγγελματίες, με το να επιλέγονται καλύτερα τα περιστατικά, οδηγώντας στην βελτίωση του επιπέδου φροντίδας και σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Με την ευκαιρία αυτή ευχόμαστε στην εταιρεία ESTETIKA ΜΕΠΕ τα καλύτερα και ένα επιτυχημένο μέλλον και σε μία μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρεία VITA Zahnfabrik GmbH.

CONFIRMATION

We herewith confirm that
ESTETIKA MEPE
41 Fidippidou Str., 115 27 Athens, Greece
www.estetika.gr

Is authorized to represent and distribute products of VITA Zahnfabrik GmbH throughout Greece.
We are pleased that ESTETIKA MEPE will start the cooperation together with VITA Zahnfabrik GmbH in Germany and will be authorized to represent and distribute products of VITA throughout Greece as from June 1st, 2015.

With best regards
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG



Jürg Weber
Sales Manager Central & SE Europe



Φειδιππίδου 41, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7489 040, 210 7489 041 E-mail: info@estetika.gr



Κουντουριώτου 3 - 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 E-mail: newdent@otenet.gr

← DT σελίδα 4



Εικ. 5. Οι στεφάνες διαχωρίζονται για να επιτραπεί η τοποθέτηση ενός εργαλείου αφαίρεσης στεφανών Christensen

Εικ. 6. Χρήση Exrasyl για αιμόσταση και απόθεση των ούλων

Εικ. 7. Χρήση του Οδοντοπροσωπικού αναλυτή Kois για ευθυγράμμιση της μέσης γραμμής και του κοπτικού επιπέδου

Εικ. 8. Η ασθενής επέστρεψε μετά από 2-3 ημέρες για ανασκόπηση των προσωρινών αποκαταστάσεων για έγκριση των αλλαγών στη μορφολογία, την απόχρωση και άλλων επιθυμητών μεταβολών πριν την κατασκευή των μόνιμων στεφανών

Εικ. 9. Υπερώια άποψη των ολοκεραμικών στεφανών

Εικ. 10. Πρόσθια άποψη των ολοκληρωμένων ολοκεραμικών στεφανών



σητικό επίπεδο του ασθενή καθώς και αποκλίσεις στο μασητικό επίπεδο στα τρία επίπεδα του χώρου στον αρθρωτήρα με μέση

αξονο-κοπτική απόσταση 100χιλ. Αυτό επιτρέπει τον προσανατολισμό για αισθητική τοποθέτηση των προσθίων δοντιών σε σχέση με τη μέση γραμμή του προσώπου και εξασφαλίζει το σωστό προσανατολισμό του κοπτικού επιπέδου.

Προσωρινές αποκαταστάσεις: Οι προσωρινές αποκαταστάσεις ντουμπλάρονται από το διαγνωστικό κέρωμα που ενσωματώνει τις προτεινόμενες αλλαγές. Επιτρέπει στον ασθενή μία δοκιμή του τελικού αποτελέσματος επειδή μπορεί να προεπισκοπηθεί το σχεδιασμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία του θεραπευτικού σχεδιασμού. Οι στόχοι των προσωρινών αποκαταστάσεων είναι οι ακόλουθοι:

Υγεία: προστασία του πολφού και περιοδοντική υγεία και ουλική σταθερότητα.

Λειτουργία: οι προσωρινές αποκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση και εντοπισμό συγκλεισιακών και φωνητικών προβλημάτων με τις προτεινόμενες αλλαγές. Η προφορά του βήτα και του φι θα πρέπει να δημιουργούν μία ελαφρά επαφή μεταξύ των κεντρικών τομέων και του ορίου υγρής-στεγνής γραμμής του κάτω χείλους.

Αισθητική: οι προσωρινές αποκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτίμηση της βασικής απόχρωσης που θα επιλεγεί, της αποκάλυψης των κοπτικών άκρων, της μορφολογίας και του σχήματος των δοντιών, της θέσης της οδοντικής μέσης γραμμής, της χειλικής υποστήριξης,

του παραλληλισμού του κοπτικού επιπέδου με την υγρή-στεγνή γραμμή καθώς και η κυρτότητα του κάτω χείλους. Η αξιολόγηση της αισθητικής που παρέχεται από τις προσωρινές αποκαταστάσεις σε αυτό το στάδιο είναι σημαντική για να καθοδηγήσει τον ασθενή στον κατάλληλο βαθμό αποκάλυψης των δοντιών για ένα αισθητικό χαμόγελο. Οι προσωρινές στεφάνες κατασκευάστηκαν από σύνθετη ρητίνη bis-acryl. Η μορφολογία όλων των δοντιών διατηρήθηκε με την κατάλληλη κυρτότητα και ομαλότητα με διαθέσιμο χώρο για μεσοδόντιο καθαρισμό λόγω της ναρθηκοποίησής τους.

Δόθηκαν οδηγίες στοματικής υγιεινής κατά τη φάση των προσωρινών αποκαταστάσεων και ζητήθηκε να επιστρέψει σε δύο με τρεις ημέρες για την τελική έγκριση. Προτείνω αυτή την αργή προσέγγιση εκτίμησης των προσωρινών αποκαταστάσεων επειδή ο ασθενής δεν πιέζεται να αποφασίσει αν του αρέσουν ή όχι οι προσωρινές αποκαταστάσεις την ημέρα των οδοντικών παρασκευών. Επειδή συχνά χορηγείται τοπική αναισθησία δεν μπορεί να εκτιμήσει επαρκώς την αισθητική της περιοχής σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς ρωτούν επίσης συχνά φίλους και συγγενείς για τις προτεινόμενες αλλαγές και ο επιπλέον χρόνος επιτρέπει στον ασθενή να εξοικειωθεί με τη νέα του εμφάνιση.

Αν οι προσωρινές αποκαταστάσεις χρειάζονται τροποποιήσεις, μπορούν να ρυθμιστούν και να ληφθεί ένα αποτύπωμα για να ενημερωθεί ο κεραμίστας για τις επιπρόσθετες αλλαγές. Οι στεφάνες λαμβάνονται από το εργαστήριο και δοκιμάζονται στο στόμα. Προτιμώ να μη χρησιμοποιώ τοπικό αναισθητικό για τον ασθενή για να εγκρίνει την τελική αισθητική πριν τη συγκόλληση. Ωστόσο, αν χρειάζεται τοπικό αναισθητικό, μία εναλλακτική τεχνική είναι να χορηγηθεί στελεχιαία αναισθησία AMSA ώστε η ένεση να επιτύχει πολφική αναισθησία των κεντρικών τομέων έως το δεύτερο προγόμφιο χωρίς

Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19, ΑΘΗΝΑ 10432
ΤΗΛ.: 210 52 32 609, 210 52 22 301
FAX.: 210 52 37 155
www.pandental.eu
e-mail: info@pantelides-dental.gr



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απολύμανση / Αποστείρωση

- 1 Ρολλό Αυτόκαυστου 200 μέτρων/5 εκ. Euronda (χαρτί / πλαστικό)
- 1 Ρολλό Αυτόκαυστου 200 μέτρων/ 10 εκ. Euronda (χαρτί / πλαστικό)
- 2 πακέτα Αντισηπτικά Μαντηλάκια Ανταλλακτικά Bechtotfix (2x120 τμχ)

Αξία προσφοράς
45,30 €

ΔΩΡΟ
200 θήκες
αυτόκαυστου Γαλλίας
9 x 25,50 εκ.
αξίας **14,40€**
ή Bechtol αντισηπτικό
υγρό φρεζών 1lt
αξίας **14,70€**

Πακέτο Καθημερινής Χρήσης

- 500 Πετσέτες τριπλές έγχρωμες Euronda
- 200 Σιελαντλίες έγχρωμες Euronda
- 100 Βελόνες Αναισθησίας Heraeus Kulzer
- 10 Βουρτσάκια Καθαρισμού Αγγλίας Stoddard
- 100 Πινελάκια αδροποίησης γεν. χρήσεως
- 1 Σύριγγα Αδροποιητικό Ana Etch Σουηδίας Nordiska
- 1 προσωρινό εμφρακτικό Calasept temp Σουηδίας Nordiska

Αξία προσφοράς 48,20 €

Και επιπλέον
ΔΩΡΟ
κώνοι χάρτου
Γερμανίας Becht
αξίας **5,40€**

Αναισθησία

- 5 κουτιά ενέσεις ubistesin ή septanest και
- 5 κουτιά βελόνες Sopira Heraeus

ΔΩΡΟ
Σύριγγα Γερμανίας
της Henke Sass
με δακτύλιο
(τραβηχτή)
Αξίας **27,87€**

Ενδοδοντία (I)

- 2 κώνιοι γουταπέρκας Γερμανίας VDW
- 2 κώνιοι χάρτου Γερμανίας Becht
- 2 καρτέλες Διευρ/Πίνες Γερμανίας VDW
- 1 Calasept temp 30gr Σουηδίας Nordiska - υλικό προσωρινών εμφράξεων έτοιμο για χρήση και
- 1 Rc-prep 18gr της Premier Αμερικής - για την διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστωμένων ριζικών σωλήνων

Αξία προσφοράς
73,40 €

ΔΩΡΟ
8 Βελόνες
Διακλυσμού
της RINN H.P.A.
Αξίας **14,66€**
ή
Calasept
Χλωρεξιδίνη
2% 100ml
Αξίας **13,00€**

Ενδοδοντία (II)

- Υδροξείδιο του Ασβεστίου CALASEPT 2 X 1.5 ml της Nordiska
- Ρητινώδες φύραμα για μόνιμη εμφραξη σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης 12gr PERMA EVOLUTION της Becht Γερμανίας

Αξία προσφοράς 60,80 €

ΔΩΡΟ
2 κώνιοι χάρτου
Γερμανίας Becht
Αξίας **10,80€**

Θερμοπλαστική γουταπέρκα Soft-Core®

Τώρα το Soft-Core μπορεί να γίνει το απόλυτο εργαλείο στα χέρια σας ΜΟΝΟ με **113,30 €**
Συμπεριλαμβάνει ενσύρματη συσκευή, set 18 κώνων γουταπέρκας και 6 εργαλεία επαλήθευσης.



- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α
- Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

← DT σελίδα 6

νωδότητα του προσώπου και των μυών της έκφρασης. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με ένα σύστημα έγχυσης ελεγχόμενο από υπολογιστή όπως το Wand που χορηγεί μία πρακτικά ανώδυνη υπερωία ένεση. Εφόσον ο ασθενής είναι ικανοποιημένος και εγκρίνει την τελική αισθητική, οι αποκαταστάσεις προετοιμάζονται για συγκόλληση. Η ασθενής επέστρεψε στο ιατρείο μετά από μία εβδομάδα για μία τελική αξιολόγηση της αισθητικής, της φώνησης και της σύγκλεισης.

Συμπεράσματα

Η αισθητική αποκατάσταση ενός ασθενή με λειτουργικά υποβαθμισμένη οδοντοφυΐα απαιτεί συχνά μία πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση. Απαιτείται η κατάλληλη ακολουθία και θεραπευτικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει περιοδοντική, ορθοδοντική, αισθητική και επανορθωτική θεραπεία σε επικοινωνία με ολόκληρη την θεραπευτική ομάδα, από τον ασθενή και τον κεραμίστα έως τους θεράποντες ιατρούς. Η χρήση προσωρινών αποκαταστάσεων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ενός επιτυχημένου αισθητικού αποτελέσματος τόσο για τον ασθενή όσο και για την οδοντιατρική ομάδα.

Οι προσωρινές αποκαταστάσεις επιτρέπουν μία προεπισκόπηση των μελλοντικών τους δοντιών, δίνοντας τη δυνατότητα εκτίμησης των αισθητικών και λειτουργικών μεταβολών. Μπορούμε να λάβουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με αισθητικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένων της κοπτικής αποκάλυψης, της παρειογλωσσικής θέσης των δοντιών, της γραμμής γέλωτος, της οδοντικής απόχρωσης και επιπρόσθετα μπορούν να εκτιμηθούν λειτουργικά κριτήρια με τις φωνητικές και συγκλεισιακές μεταβολές.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό
DTI UK Edition

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οδοντινικής υπερευαισθησίας

Από την επιστημονική ομάδα του Dental Tribune

Το Dental Tribune πραγματοποιεί μία ανασκόπηση του συμποσίου με χορηγό την GSK και τίτλο "Επιτυχημένη Θεραπευτική Αντιμετώπιση της οδοντινικής υπερευαισθησίας στο οδοντιατρείο που πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στη Βραζιλία.

Στο Ετήσιο Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο της FDI, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βραζιλία η GSK αποτέλεσε το χορηγό σε ένα συμπόσιο αφιερωμένο στην οδοντινική υπερευαισθησία.

Η πρώτη ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Martin Addy. Ο καθηγητής Addy είναι λέκτορας στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bristol. Η παρουσίασή του με τίτλο Οδοντινική Υπερευαισθησία: Κατανόηση του Προβλήματος, είχε ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος εξετάζοντας τον αποδεκτό ορισμό της υπερευαισθησίας και τα πιθανά αίτια του προβλήματος.

Ο καθηγητής Addy περιέγραψε το ιστορικό της επιστημονικής γνώσης σχετικά με την οδοντινική υπερευαισθησία αναφέροντας μία φράση από μία εργασία του 1982: Ένα αίνιγμα που συναντάται συχνά αλλά σπάνια γίνεται κατανοητό. Παρόλο που υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα για περισσότερα από 100 χρόνια, είναι ακόμη πολλά στοιχεία που παραμένουν άγνωστα.

Για να ορίσει την οδοντινική υπερευαισθησία, ο καθηγητής Addy χρησιμοποίησε τον ορισμό από μία εργασία του 1997: Η οδοντινική υπερευαισθησία χαρακτηρίζεται από σύντομο, οξύ πόνο που προέρχεται



από εκτεθειμένη οδοντινική σε απόκριση συνήθως

σε θερμικά, εξαισμικά, απτικά, ωσμωτικά, ή χημικά ερεθίσματα που δεν μπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή οδοντικής βλάβης ή παθολογίας. Σχολίασε πως είναι πολύ δύσκολη η κλινική διάγνωση της ευαισθησίας, καθώς η ευαίσθητη και η μη ευαίσθητη οδοντινική έχουν την ίδια κλινική εικόνα στο επίπεδο που

μπορεί να την παρατηρήσει ο οδοντίατρος.

Περιέγραψε την πιο αποδεκτή θεωρία για την υπερευαισθησία-την υδροδυναμική θεωρία. Εξημώντας τον υδροδυναμικό μηχανισμό σε σχέση με τα δόντια, αναφέρθηκε

→ DT σελίδα 8



Join the EVolution



The new
ASTRA TECH Implant System™ EV

ROADSHOW:

23/04/15: Θεσσαλονίκη, Μπλε αμφιθέατρο, Α.Π.Θ. 12:00 -14:00

24/04/15: Αθήνα, CROWNE PLAZA, 19:00-22:00

Δηλ. συμμετοχής: 210 3837334

Learn more



www.jointheev.com



The foundation of this evolutionary step remains the unique ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex, well-documented for its long-term marginal bone maintenance and esthetic results. www.dentsplyimplants.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Δ.ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΤΖΩΡΤΖ 12 106 77,
ΤΗΛ.: 210 3837334, mavraid@otenet.gr, www.mavraidopoulos.gr



← DT σελίδα 7

σε μία μελέτη όπου αναλύθηκαν ένα δόντι με ευαισθησία και ένα φυσιολογικό. Βρέθηκε πως το δόντι με ευαισθησία εμφάνιζε οκταπλάσια οδοντινοσωληνάρια και πως αυτά είχαν τη διπλάσια διάμετρο σε σχέση με το φυσιολογικό δόντι.

Ακολούθησε η ομιλία της Nicola West από την Οδοντιατρική Σχολή του Bristol. Η παρουσίασή της με τίτλο Οδο-

ντική Υπερευαισθησία: η σημασία των παραγόντων του ασθενή, εξέταζε τους αιτιολογικούς παράγοντες της υπερευαισθησίας.

Τόνισε την επίδραση της υπερευαισθησίας στη συμπεριφορά των ασθενών των οποίων η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εστίασε στο ζήτημα πως η οδοντινική θα πρέπει να αποκαλυφθεί για να προκληθεί υπερευαισθησία και πως η αποκάλυψη προκαλεί-

ται κυρίως από ουλική υφίζηση, περιοδοντικά προβλήματα ή διάβρωση της αδαμαντίνης.

Η ουλική υφίζηση προκαλείται συχνά από τραυματισμό των ορίων, συνήθως από το έντονο βούρτσισμα του ασθενή. Η καθηγήτρια West πρότεινε την εξέταση της οδοντόβουρτσας του ασθενή και τη μέθοδο βουρτσίσματος όταν προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια της υπερευαισθησίας, αλλά τόνισε πως θα

είναι δύσκολο καθώς οι ασθενείς τροποποιούν τον τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών τους όταν τους παρατηρούμε.

Η καθηγήτρια West συζήτησε επίσης επί μακρόν το ζήτημα της διάβρωσης της αδαμαντίνης. Εξήγησε τη διαφορά μεταξύ ενδογενούς (γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση) και εξωγενούς (δηλαδή προσβολή από οξέα των τροφών και των ποτών) διάβρωσης.

Όταν εξετάζουμε την εξωγενή διάβρωση, η καθηγήτρια εστίασε στην προσβολή των δοντιών από οξέα που προέρχονται από τη διατροφή του ασθενή. Πολλά από τα προβλήματα φαίνεται πως προέρχονται από την ποικιλία των διαθέσιμων όξινων ποτών. Σύμφωνα με τις τιμές των πωλήσεων αναψυκτικών του 2009 στη Μεγάλη Βρετανία, καταναλώνονται 229.1 λίτρα αναψυκτικών το χρόνο από κάθε Βρετανό. Αυτό σημαίνει 0.65 λίτρα την ημέρα. Για έναν ασθενή ευπαθή σε οδοντικές διαβρώσεις, αυτή μπορεί να αποτελεί μία σημαντική όξινη προσβολή για τα δόντια.

Η καθηγήτρια συνέστησε τακτική εξέταση της οδοντικής αποτριβής και διάβρωσης, ειδικά λόγω της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού και της ποικιλίας διαθέσιμων θεραπειών για τη μείωση της βαρύτητας της ευαισθησίας. Παρουσίασε επίσης ορισμένες συμβουλές που μπορεί να δώσει ο οδοντίατρος στους ασθενείς: μείωση της συχνότητας έκθεσης των δοντιών σε οξέα, αποφυγή όξινων τροφών και ποτών τη νύκτα, αποφυγή του τριξίματος και σφιξίματος των δοντιών και αποφυγή βουρτσίσματος των δοντιών αμέσως μετά από όξινη έκθεση.

Η επόμενη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Stephen Mason. Η παρουσίασή του με τίτλο Sensodyne Rapid Relief, άμεση και μακροπρόθεσμη προστασία, περιελάμβανε λεπτομερή παρουσίαση του τελευταίου προϊόντος της GSK για την καταπολέμηση της ευαισθησίας. Ο Dr. Mason παρουσίασε με λεπτομέρειες τις διαφορετικές συνθέσεις της Sensodyne στο παρελθόν με χρήση χλωριούχου στρόντιου και των μειονεκτημάτων που εμφάνιζε, συγκεκριμένα δυσγευσία καθώς και ασυμβατότητα με το φθόριο.

Το χλωριούχο στρόντιο αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από το ακεταλικό στρόντιο λόγω της συμβατότητάς του με το φθόριο, της μη εναπόθεσης χρωστικών στα δόντια και της βελτιωμένης γεύσης. Σήμερα έχει αναπτυχθεί σε ένα εμπορικό προϊόν που ονομάζεται Sensodyne Rapid Relief. Ο Dr. Mason συζήτησε ορισμένες από τις κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για το προϊόν, αρχικά έναντι μίας φθοριούχου οδοντόπαστας και στη συνέχεια έναντι ενός προϊόντος του ανταγωνισμού που περιέχει 8% αργινικό ανθρακικό αβέσσιο. Οι μελέτες έδειξαν

→ DT σελίδα 10

Bien Air⁺
Dental

BORA LED & PRESTIGE LED ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛ

Φανταστείτε απίστευτα ελαφριές χειρολαβές, εκλεπτυσμένες, αποδοτικές και συγχρόνως δυνατές!!!

Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις η Bora και η Prestige BLACKLINE συνδυάζουν λαβές από ανθρακονήματα. Αυτές οι χειρολαβές είναι εξαιρετικά ελαφριές με αποτέλεσμα να είναι ευκολόχρηστες.

Επιπλέον, τα ανθρακονήματα προσφέρουν ενισχυμένη αντοχή στη φθορά, τριβή, στρέψη & κρούση.

Οι δύο ενιαίες BIEN-AIR φωτεινές ράβδοι κατανέμουν ιδανικά την ένταση του LED. Στην ουσία εξαλείφεται η σκιά.

Διαχέοντας ένα φυσικό λευκό φως, παρόμοιο με το φως της ημέρας το LED έχει διάρκεια ζωής 10 φορές περισσότερο από τις παραδοσιακές λάμπες.

Η ισχυρή Bora και η μικροσκοπική Prestige με την μικρή διαμέτρου κεφαλή διατίθενται με λαβή μεταλλική ή ανθρακονημάτων θέτοντας νέα κριτήρια εργονομίας, απόδοσης και σταθερότητας.

04/2010

ANTHOS HELLAS
Οδοντιατρικά μηχανήματα
3ης Σεπτεμβρίου 35
104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.5231400, 210.5249261
Fax: 210.5232537

DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Καρυοφύλη 24
115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.7775021, 210.7775110
Fax: 210.7770480
dentalco@otenet.gr, www.dentalcom.gr

Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Χαλκοκονδύλη 19
104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.5231800, 210.5222301
Fax: 210.5237155
lpantel@hol.gr

50
YEARS
technologies
& inspiration

VivaStyle®



VivaStyle 10% & 16%

Εξελιγμένο σύστημα λεύκανσης με υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 10% & 16%

- 1) Άνετη εφαρμογή.
- 2) Μειωμένη ευαισθησία.
- 3) Άριστη διατήρηση αποτελέσματος.
- 4) Παρατεταμένη δράση στο σωστό σημείο.
- 5) 1 ώρα / Εφαρμογή.
- 6) Απελευθέρωση οξυγόνου ώστε να επιτυγχάνεται λεύκανση των δυσχρωμιών.
- 7) Βαθμονομημένη επανακλεινόμενη σύριγγα με περισσότερο υλικό (3ml/σύριγγα).

Patient Kit **81,55€**

4 σύριγγες Vivastyle (3ml/σύριγγα)
2 φύλλα για δισκάρια
1 θήκη για δισκάρια
τσαντάκι

1 + 1 ΔΩΡΟ
Τελ. Τιμή 40,77€

Touch Up Kit **31,55€**

2 σύριγγες VivaStyle (3ml/σύριγγα)

Ανταλ. φύλλα για δισκάρια
18,85€



VivaStyle Paint on Plus

Αποτελεσματική Λεύκανση χωρίς δισκάρια

- 1) Ορατό αποτέλεσμα μόνο σε 7 ημέρες.
- 2) 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- 3) 10' / Εφαρμογή.
- 4) Περιέχει προβιταμίνη D-Panthenol, η οποία έχει καταπραϋντική δράση στα ούλα.
- 5) Λεύκανση ολόκληρου χαμόγελου, μεμονωμένων δοντιών, όμορων περιοχών.
- 6) Δεν διαλύεται από το σάλιο.
- 7) Ήπια εφαρμογή.
- 8) Εύκολη καθημερινή χρήση.
- 9) Οικονομικότερο, χωρίς την χρήση δισκαρίου.
- 10) Ικανοποιημένοι ασθενείς.

VivaStyle Paint on Plus

1 σωληνάριο 20ml
14 βουρτσάκια
14 θήκες διανομής
τσαντάκι

35,55€



Χ. ΠΑΝΤΟΣ - Ι. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ Ο.Ε.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 21, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 5235981 - 210 5235136
e-mail: info@metrodent.gr, <http://www.metrodent.gr>

ivoclar
vivadent®